



ARRETE  
N° 155/MS/DC/SGM/CJ/DPMED/SA/165SSGG19  
portant modalités d'acquisition des médicaments  
et produits pharmaceutiques essentiels en  
République du Bénin.

## LE MINISTRE DE LA SANTE

- Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 Mars 2016 ;
- vu la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- vu le décret n° 2019-396 du 5 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ;
- vu le Décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- vu le décret n° 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure type des ministères ;
- vu le Décret n° 2016-426 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;
- vu l'arrêté N°0093/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DA/SA du 07 Mars 2012 portant création, composition, attribution et fonctionnement du comité national des approvisionnements en produits de santé au Bénin (CNAPS)

VU

Le Président de  
l'Autorité de  
Régulation des  
Marchés Publics,

Eric MAOIGNON



ARRETE :

### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

**Article 1 :** En application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, le présent arrêté définit les conditions d'acquisition des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels dont la procédure déroge aux règles générales de passation des marchés publics

### CHAPITRE II : DU CHAMP D'APPLICATION

**Article 2 :** le présent arrêté vise les médicaments et produits pharmaceutiques essentiels pour les services et formations sanitaires.



**Article 3** : La liste des médicaments et produits pharmaceutiques visés par le présent arrêté est définie de commun accord entre le ministère de la santé et l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

**Article 4** : Les médicaments entrant dans le champ d'application de la dérogation sont ceux de la liste nationale des médicaments essentiels et ceux de la liste des dispositifs médicaux essentiels auxquels s'ajoutent :

- les réactif de laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
- les substances actives de références pour le contrôle de qualité des médicaments et produits pharmaceutiques.



### **CHAPITRE III : DES MODALITES D'ACQUISITION**

**Article 5** : La liste ci-dessus définie est révisée tous les deux (2) ans après avis de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

**Article 6** : L'acquisition des médicaments et produits pharmaceutiques essentiels définis à l'article 5 ci-dessus se fait conformément aux modalités ci-après :

**Par consultation directe :**

- auprès de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME) ainsi que des plateformes d'achat agréées par l'Etat ;
- lorsque le fournisseur jouit de l'exclusivité de la fourniture de ces produits, soit du fait d'une situation de monopole, soit du fait d'une situation de rupture chez les autres fournisseurs ;
- en cas de situation imprévisible ou de cas de force majeure qui nécessite une intervention immédiate de l'autorité contractante.

**Par appel d'offres restreint national ou international** en consultant au moins trois (03) fournisseurs agréés.

A cet effet, une base de données des fournisseurs susceptibles d'être consultés est constituée auprès de l'autorité contractante. Elle est mise à jour annuellement suite à un avis de présélection dont les modalités sont définies par les organes de gestion de chaque autorité contractante.

**Article 7** : Les modalités de consultation, d'attribution et de paiement de chaque marché sont définies par les organes de gestion de l'autorité contractante. La présence et la participation des utilisateurs finaux doit se faire à toutes les étapes.

**Article 8** : La réception des médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques essentiels objets du présent arrêté se fait conformément aux procédures de réception des commandes publiques en vigueur au niveau de chaque autorité contractante.

### **CHAPITRE IV : DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES**

**Article 9** : Les infractions relatives à l'application du présent arrêté ainsi que les contentieux relatifs à la procédure dérogatoire de la commande publique des médicaments et autres

produits pharmaceutiques essentiels sont régis conformément aux dispositions de la loi 2017-04 portant code des marchés publics en République du Bénin.

**Article 10** : Le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques (DPMED), le Directeur National de la Santé Publique, les Directeurs d'agences, les Coordonnateurs de projets et programmes ainsi que les Responsables des services et formations sanitaires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

**Article 12** : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Cotonou, le

19 DEC 2019



**Benjamin I. B. HOUNKPATIN**

Ministre de la Santé

**AMPLIATIONS** : PR 04 ; AN 02 ; CC 02 ; CS 02 ; CES 02 ; HAAC 02 ; HCJ 02 ; MS 04 ; ARMP (02) ;  
Autres Ministères 20 ; SGM 02 ; IGM 02 ; Directions Centrales et Directions  
Techniques 10 ; DDS 06 ; Archives 02 ; JORB 01.



8

ème Edition



MINISTRE DE LA SANTE  
REPUBLIQUE DU BENIN

DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MEDICAMENT ET DES  
EXPLORATIONS DIAGNOSTIQUES  
(DPMED)

# LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ENFANTS ET ADULTES



Juillet 2018



MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
REPUBLIQUE DU BENIN

BP 01-882  
BENIN  
Tél. +229 21 33 2178/ 21 33 21 63  
[info@sante.gouv.bj](mailto:info@sante.gouv.bj)  
[www.sante.gouv.bj](http://www.sante.gouv.bj)

DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MÉDICAMENT ET DES EXPLORATIONS  
DIAGNOSTIQUES (DPMED)

---

**LISTE NATIONALE  
DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS  
ENFANTS ET ADULTES**

---

8<sup>ème</sup> Edition  
(Juillet 2018)

Avec l'appui de



## SOMMAIRE

|   |     |
|---|-----|
| PREFACE .....   | 4   |
| LISTE DES SYMBOLES ET SIGLES .....  | 5   |
| Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale.....        | 6   |
| Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale .....       | 48  |
| LISTE DE MEMBRES DU COMITE AD HOC CHARGE DE LA RÉVISION DE LA LNME (8ème Edition) ..... | 100 |
| Index alphabétique des DCI.....   | 101 |

## PREFACE

La Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) vise d'importants objectifs stratégiques dont notamment la disponibilité géographique des médicaments, l'accessibilité financière, l'assurance qualité et l'usage rationnel des produits de santé.

Dans le cadre d'une atteinte optimale de l'objectif relatif à l'usage rationnel, il s'avère nécessaire d'élaborer et d'actualiser régulièrement la Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME) en tenant compte des pathologies qui déciment nos populations, ainsi que de leur niveau de prévalence.

En effet, la mise à jour régulière de la Liste Nationale des Médicaments Essentiels traduit la volonté du Gouvernement de rendre disponible au niveau des établissements de soins, des produits pharmaceutiques efficaces, sûrs et de qualité garantie. Il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de notre pays à avancer progressivement vers la couverture sanitaire universelle en vertu de laquelle chaque individu doit avoir accès aux médicaments dont il a réellement besoin, au bon moment et au bon endroit.

La présente Liste Nationale des Médicaments Essentiels est la huitième édition validée par les acteurs et autres professionnels de la santé, à l'issue d'un atelier tenu le 05 juillet 2018 à Bénin Marina Hôtel. Cette édition fait suite à la publication de la 20<sup>ème</sup> liste modèle adulte et de la 6<sup>ème</sup> liste modèle enfant des médicaments essentiels dont la mise en œuvre a été lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en mars 2017.

Elle a été élaborée selon une méthodologie qui tient compte des directives thérapeutiques standards des affections courantes, des normes et protocoles en vigueur au niveau des différents programmes nationaux de santé. Le processus d'élaboration ayant été participatif et inclusif, il a permis de prendre en compte les observations et suggestions des professionnels de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cette méthodologie a également permis d'élargir la liste des produits pharmaceutiques à prendre en compte afin de répondre aux besoins des populations face aux pathologies les plus courantes.

En outre, dans le souci de faire face aux problèmes de résistance aux antimicrobiens dans le monde, l'OMS a formulé de nouvelles recommandations qui permettent de distinguer les antibiotiques à utiliser contre les infections courantes et ceux qui doivent être réservés pour les situations les plus graves. La présente version de la liste nationale a été élaborée en tenant compte de cette classification, toute chose qui constitue une innovation dans l'élaboration de la 8<sup>ème</sup> édition de cet outil essentiel pour l'amélioration des soins de santé. La nouvelle liste regroupe au total 553 Dénominations Communes Internationales (DCI) réparties dans 30 classes thérapeutiques.

Je voudrais donc adresser aux membres du Comité de sélection, mes remerciements pour leur précieuse contribution au processus ayant conduit à la finalisation du présent document. Mes remerciements s'adressent également à l'OMS et à l'UNICEF pour leur appui à l'élaboration de cet outil de mise en œuvre de la Politique Pharmaceutique Nationale.

Je voudrais enfin saisir la présente occasion pour inviter tous les acteurs, les professionnels de la santé et les Partenaires Techniques et Financiers du secteur de la santé, à apporter leur appui à la mise en œuvre efficace de cette version de la Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME), toute chose qui contribuera de façon significative à l'amélioration des soins de santé.



*Ben*  
**Benjamin I. B. HOUNKPATIN**

## **LISTE DES SYMBOLES ET SIGLES**

- : **Médicament dont la prescription est interdite au niveau sanitaire considéré;**
  
- \* : **Médicaments non enregistrés au Bénin ;**
  
- C : **Produits pour CSC avec bloc opératoire ;**
  
- CHD : **Centre Hospitalier Départemental ;**
  
- CHU : **Centre Hospitalier et Universitaire ;**
  
- CSA : **Centre de Santé d'Arrondissement ;**
  
- CSC : **Centre de Santé de Commune ;**
  
- D : **Médicaments dont la prescription est réservée aux Médecins ;**
  
- HZ : **Hôpital de Zone ;**
  
- L : **Produits pour CSC avec laboratoire ;**
  
- R : **produit à conserver au Réfrigérateur (2 - 8°C);**
  
- U : **Médicaments dont l'utilisation doit être contrôlée par les Médecins.**
  
- A : **Antibiotiques du groupe « ACCÈS » : à rendre disponible à tout moment pour le traitement d'un large éventail d'infections courantes ;**
  
- WA : **Antibiotiques du groupe « A SURVEILLER » : ayant un potentiel élevé de résistance à utiliser avec précaution ;**
  
- RE : **Antibiotiques du groupe « RESERVER » à utiliser en dernier recours lorsque toutes les autres possibilités ont échoué.**



**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination  
Commune Internationale**

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |

1 ANESTHESIQUES ET GAZ MEDICAUX

1.1 Anesthésiques généraux et oxygène

1.1.1 Gaz halogénés

|       |  |                                     |   |   |   |      |   |                            |
|-------|--|-------------------------------------|---|---|---|------|---|----------------------------|
| 1     | Halothane                                    | inhalation: flacon de 250 ml        | x | x | x | -    | - | Fluothane*                 |
| 2     | Isoflurane                                   | inhalation: flacon de 250 ml        | x | x | x | -    | - | Forène*                    |
| 3     | Sevoflurane                                  | Inhalation: 250mg flacon de 250ml   | x | x | x | -    | - | SEVORANE*                  |
| 1.1.2 | Autres gaz                                   |                                     |   |   |   |      |   |                            |
| 1     | Oxygène                                      | inhalation                          | x | x | x | x(U) | - | Oxygène*                   |
| 1.1.3 | Anesthésiques injectables                    |                                     |   |   |   |      |   |                            |
|       | Narcotiques hypnotiques                      |                                     |   |   |   |      |   |                            |
| 1     | Kétamine                                     | inj. 50 mg/ml                       | x | x | x | -    | - | Kétalar*                   |
| 2     | Thiopental sodique                           | 0,5 amp inj                         | x | x | x | -    | - | Nesdonal*                  |
|       |  | 1 g amp inj                         | x | x | x | -    | - |                            |
| 3     | Midazolam                                    | 5 mg, amp inj                       | x | x | x | -    | - | Hypnovel*                  |
| 4     | Propofol                                     | 200 mg, amp inj                     | x | x | x | -    | - | Diprivan*                  |
|       |  | 500 mg, amp inj                     | x | x | x | -    | - |                            |
| 5     | Etomidate                                    | 2mg/ml, inj                         | x | x | x | -    | - | Hypnomidate*               |
|       | Les curares                                  |                                     |   |   |   |      |   |                            |
| 1     | Chlorure de suxamethonium (succinyl choline) | Inj: 50mg/mL ampoule de 2mL         | x | x | x | -    | - | Celcurine* ; Suxamethonium |
| 2     | Atracurium                                   | Injectable : 10mg/mL ; 25mg/2,5mL   | x | x | x | -    | - | Tracrium*                  |
| 3     | Pancuronium                                  | Injectable : 2mg/ml, ampoule de 2mL | x | x | x | -    | - | Pavulon*                   |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|       | DESIGNATION (DCI)       | PRESENTATIONS ET DOSAGES  | NIVEAU D'UTILISATION                         |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |   |                       |
|-------|-------------------------|---------------------------|--|-----|----|-----|-----|------------------------------------|---|-----------------------|
|       |                         |                           | CHU  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |   |                       |
| 1.1.4 | 4                       | Vecuronium                | Injectable : 4mg/mL ;10mg/mL                 |     | x  | x   | x   | -                                  | - | Norcuron*             |
|       | Anesthésiques locaux    |                           |  |     |    |     |     |                                    |   |                       |
|       | 1                       | Bupivacaïne               | 0,5% flacon 20 ml; 50 ml inj et 20 mg/4ml    |     | x  | x   | x   | x(c)                               | - | Marcaïne*             |
|       | 2                       | Bupivacaïne + épinéphrine | 0,5% et 2% inj                               |     | x  | x   | x   | x(c)                               | - | Marcaïne+ adrénaline* |
|       | 3                       | Bupivacaïne hyperbare     | 0,5%/4ml                                     |     | x  | x   | x   | x(c)                               | - | MARCAINE hyperbare*   |
|       | 4                       | Lidocaïne                 | injectable: 2% capsule de 1,8 ml             |     | x  | x   | x   | x                                  | - | Xylocaine             |
|       |                         |                           | injectable: 2% flacon 20 ml ; 1% flacon 20ml |     | x  | x   | x   | x                                  | x |                       |
|       |                         |                           | injectable: 2% flacon 50 ml                  |     | x  | x   | x   | x                                  | - |                       |
|       |                         |                           | gel 5% oral                                  |     | x  | x   | x   | -                                  | - |                       |
|       |                         |                           | spray 5%                                     |     | x  | x   | x   | x(c)                               | - |                       |
| 1.1.5 | 5                       | Ropivacaïne               | injectable: 2mg/ml, 10ml ou 20ml             |     | x  | x   | x   | -                                  | - | Naropéine*            |
|       |                         |                           | injectable: 7,5mg/ml, 10ml ou 20ml           |     | x  | x   | x   | -                                  | - |                       |
|       |                         |                           | injectable: 10mg/ml, 10ml ou 20ml            |     | x  | x   | x   | -                                  | - |                       |
|       | 6                       | Articaïne sans adrénaline | 2% carpule de 1,8ml inj                      |     | x  | x   | x   | -                                  | - | UBISTESIN*            |
|       | 7                       | Articaïne + adrénaline    | 1°/100 mlcarpule de 1,8ml inj                |     | x  | x   | x   | -                                  | - | UBISTESIN*            |
|       |                         | Articaïne + adrénaline    | 1°/200 ml carpule de 1,8ml inj               |     | x  | x   | x   | -                                  | - | UBISTESIN*            |
|       | 8                       | Mepivacaïne               | injectable: 1% , 2% carpule de 1,8ml         |     | x  | x   | x   | -                                  | - | CARBOCAINE*           |
|       | Anesthésiques Adjuvants |                           |  |     |    |     |     |                                    |   |                       |
|       | 1                       | Ephedrine                 | Amp de 1 ml dosé à 30 mg                     |     | x  | x   | x   | -                                  | - | Ephédrine             |

**2 ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS ET MEDICAMENTS UTILISES POUR LE TRAITEMENT DE LA GOUTTE**

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |

2.1 Non opioïdes

|   |                               |                                    |      |      |      |   |   |  |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------|------|------|---|---|--|
| 1 | Paracétamol                   | 500mg comp                         | x    | x    | x    | x | x | Claradol, Dafalgan, Efferalgan; doliprane; Perfalgan, Paracetamol, Perfaldis, Genpar |
|   |                               | 600 mg suppo                       | x    | x    | x    | x | x |  |
|   |                               | 500mg inj                          | x    | x    | x    | x | x |  |
|   |                               | 1g inj                             | x    | x    | x    | x | x |  |
| 2 | Néfopam                       | 20mg/2ml inj                       | x    | x    | x    | x | x | ACUPAN   |
| 3 | Acide acétylsalicylique       | 1000 mg comp                       | x    | x    | x    | x | x | Aspirine Winthrop, Aspirine UPSA, Aspro  |
|   |                               | 500mg comp                         | x    | x    | x    | x | x |  |
| 4 | Acétylsalicylate de DL-lysine | 1g inj et 500 mg inj               | x    | x    | x    | x | x | Aspégic  |
|   |                               | 100 mg et 250 mg Pdre sol. Buvable | x    | x    | x    | x | x |  |
| 5 | Tramadol                      | 50 mg gélule                       | x(D) | x(D) | x(D) | - | - | TRABAR, ZAMUDOL gélule, TRAMADIS inj   |
|   |                               | 100 mg/ml inj                      | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |  |

2.2 Analgésiques opioïdes

|   |                       |                        |      |      |      |   |   |   |
|---|-----------------------|------------------------|------|------|------|---|---|---|
| 1 | Buprenorphine         | 0,3 mg inj             | x    | x    | x(D) | - | - | Temgésic*   |
|   |                       | 0,2 mg comp            | x    | x    | x(D) | - | - |   |
| 2 | Nalbuphine            | Ampoule 20mg/2mL       | x    | x    | x(D) | - | - | NUBAIN*   |
| 3 | Morphine chlorhydrate | 10mg comp              | x(D) | x(D) | x(D) | - | - | Skénan* ,ActiSkenan*; Morphine chlorhydrate AGUETTANT* Morphine chlorhydrate COOPER*; Moscotin* |
|   |                       | 10mg comp LP           | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |   |
|   |                       | 30mg comp LP           | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |   |
|   |                       | 60mg comp LP           | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |   |
|   |                       | 10mg/ 5ml solution buv | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |   |
|   |                       | 10 mg/ml, 1 ml inj     | x(D) | x(D) | x(D) | - | - |   |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)      | PRESENTATIONS ET DOSAGES                 | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                                 |
|---|------------------------|--|----------------------|-----|------|------|-----|--|
|   |                        |  | CHU                  | CHD | HZ   | CSC  | CSA |  |
| 4 | Fentanyl               | Injectable : 0,5 mg/10mL ;<br>0,1mg /2mL | x                    | x   | X(D) | -    | -   | Fentanyl , Actiq*, Fentanyl SANDOZ*,<br>Durogesic*, <b>Abstral</b> |
|   |                        | 25µg/h disp transderm                    | X                    | X   | X(D) | -    | -   |  |
| 5 | Sufentanil             | 10µg /2ml inj                            | X                    | X   | X(D) | -    | -   | Sufenta*,<br>Sufentanil MYLAN*<br>Sufentanil RENAUDIN*             |
|   |                        | 50 µg/ 10 ml inj                         | X                    | X   | X(D) | -    | -   |  |
|   |                        | 250µg/5ml inj                            | X                    | X   | X(D) | -    | -   |  |
| 6 | Remifentanil           | Injectable : 1mg, 2mg,5mg poudre         | X                    | X   | X(D) | -    | -   | Ultiva   |
| 7 | Méthadone chlorhydrate | gélule : 5 mg; 10 mg                     | X                    | X   | X(D) | -    | -   | METHADONE*   |
|   |                        | Sirop :5mg/ 3,75 mL; 10mg/ 7,5mL         | X                    | X   | X(D) | -    | -   |  |
| 8 | Paracétamol + Codeine  | Comprime : 500mg/30mg                    | x                    | x   | x    | x(D) | -   | Efferalgan codeiné   |

2.3 Anti-inflammatoires

2.3.1 Antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS)

|   |                               |                                 |   |   |      |      |   |                         |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------|---|-------------------------|
| 1 | Acide acétylsalicylique       | Comprime : 500mg ,1g            | X | X | X    | X    | X | Aspirine                |
|   |                               | Sachet : 500mg, 1g              | X | X | X    | X    | X |                         |
|   |                               | Injectable : 500mg, 1g          | X | X | X    | X    | X |                         |
| 2 | Acétylsalicylate de DL-lysine | Comprime : 500mg, 1g            | x | x | x    | x    | x | Aspegic                 |
|   |                               | Sachet : 500mg, 1g              | x | x | x    | x    | x |                         |
|   |                               | Injectable : 500mg,1g           | X | X | X    | X    | x |                         |
| 3 | Ibuprofène                    | comprime : 200 mg; 400 mg       | X | X | X    | X    | X | Brufen, Advil, spedifen |
| 4 | Ketoprofene                   | Comprime : 100mg ; suppo: 100mg | X | X | X    | X    | X | Profenid                |
|   |                               | Comprime LP : 200mg             | X | X | X    | X    | X |                         |
|   |                               | Injectable : 100mg/2mL          | X | X | X    | X    | X |                         |
| 5 | Indométacine                  | comprime : 25 mg                | X | X | X(U) | X(U) | - | Indocid                 |
|   |                               | Suppositoire : 50mg et 100 mg   | X | X | X(U) | X(U) | - |                         |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES  | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                              |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|   |                   |                           | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 6 | Diclofénac        | Comprimé : 50 mg ,100mg   | X                    | X   | X  | X   | X   | Voltarène, Olfen, Diflamex,<br>Diclomax, Diclowal,<br>Dolotren, |
|   |                   | Suppositoire : 50mg,100mg | X                    | X   | X  | X   | X   |   |
|   |                   | Injectable :75mg          | X                    | X   | X  | X   | X   |   |
| 7 | Acide Niflumique  | Comprime :400mg,800mg     | X                    | X   | X  | X   | X   | Nifluril  |
|   |                   | Suppositoire : 700 mg     | X                    | X   | X  | X   | X   |   |

**2.3.  
2**

**Antiinflammatoires stéroïdiens (AIS)**

|   |                |                           |   |   |   |       |   |                              |
|---|----------------|---------------------------|---|---|---|-------|---|------------------------------|
| 1 | Betaméthasone  | Injectable :4 mg/ml, 1 ml | X | X | X | X(U)  | - | Diprostène inj               |
|   |                | Comprimé : 2mg            | X | X | X | X(U)  | - | Célestène                    |
| 2 | Prednisolone   | Comprimé : 20 mg          | X | X | X | -     | - | Solupred, Cortancyl, Isolone |
| 3 | Dexaméthasone  | Injectable :4mg/ml        | X | X | X | X     | X | Dexaméthasone MYLAN*         |
| 4 | Hydrocortisone | Injectable : 100 mg       | X | X | X | X(CD) | - | Hydrocortancyl*              |

**2.4 Médiaments utilisés dans les douleurs neuropathiques**

|   |             |  |   |   |  |  |  |                                  |
|---|-------------|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | Prégabaline | Gélule : 75 mg et 150 mg                               | x | x |  |  |  | Lyrica; Pregabaline Arrow        |
| 2 | Gabapentine | Comprimé: 600 mg et 800 mg<br>Gélule: 300 mg et 400 mg | x | x |  |  |  | Neurontin; Gabapentine Biogaran* |

**2.5 Médicaments pour le traitement de la goutte**

|   |             |            |   |   |      |   |   |                                  |
|---|-------------|------------|---|---|------|---|---|----------------------------------|
| 1 | Allopurinol | 100mg comp | x | x | x(D) | - | - | Zyloric, Allopurinol TEVA*       |
| 2 | Colchicine  | 0,5mg comp | x | x | x(D) | - | - | Colchimax, Colchicine OPOCALCIUM |

**3 ANTIALLERGIQUES**

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)   | PRESENTATIONS ET DOSAGES       | NIVEAU D'UTILISATION |     |       |       |       | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|------------------------------------|
|   |                     |                                | CHU                  | CHD | HZ    | CSC   | CSA   |                                    |
| 1 | Prométhazine        | Comprimé: 25 mg                | x                    | x   | x     | x     | -     | Phénergan                          |
|   |                     | injectable: 25 mg/ml           | x                    | x   | x     | x     | -     |                                    |
|   |                     | Sirop: 25 mg/5 ml; 5 mg/5ml    | x                    | x   | x     | x     | -     |                                    |
| 2 | Dexchlorpheniramine | Comprimé: 2 mg                 | x                    | x   | x     | x     | -     | Polaramine                         |
|   |                     | injectable: 5mg ampoule de 1ml | x                    | x   | x     | x     | -     |                                    |
|   |                     | Sirop: 0,01% flacon de 125 ml  | x                    | x   | x(CD) | x(CD) | x(CD) |                                    |
| 3 | Desloratadine       | 5mg cp                         | x                    | x   | x     | x     | x     | Aerius, Deslor,                    |
|   |                     | 0,5mg/ ml solution buvable     | x                    | x   | x     | x     | x     |                                    |
| 4 | Lévocétirizine      | 5 mg comp                      | x                    | x   | x     | x     | x     | Xyzall, Lezyncet, Aristo Hatric    |
| 5 | Hydroxyzine         | 25 mg comp                     | x                    | x   | x     | x(U)  | -     | Hydroxyzine RENAUDIN*,<br>Atarax   |
|   |                     | 100 mg inj                     | x                    | x   | x     | x(U)  | -     |                                    |
|   |                     | 2% sirop                       | x                    | x   | x     | x     | -     |                                    |
| 6 | Mequitazine         | Comprimé :5mg,10mg             | X                    | X   | X     | X     | X     | Primalan                           |
|   |                     | Sirop : 2,5mL                  | X                    | X   | X     | X     | X     |                                    |

**4 ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS**

**4.1 Antidotes généraux**

|   |                |             |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------|-------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Charbon activé | 500 mg comp | x | x | x | x | - | Carbophos, Charbon de Belloc, Arkogélule charbon activé* |
|---|----------------|-------------|---|---|---|---|---|--|

**4.1 Antidotes spécifiques**

|   |                    |                         |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulfate d'Atropine | 1 mg/ml, inj; 0,5 mg/ml | x | x | x | x | - | Atropine sulfate AGUETTANT*, Atropine sulfate RENAUDIN* |
|---|--------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)    | PRESENTATIONS ET DOSAGES       | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                  |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|   |                      |                                | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 2 | Naloxone             | 0,4 mg/1 ml inj                | x                    | x   | x  | -   | -   | Narcan*, Naloxone AGUETTANT*, Naloxone MYLAN*       |
| 3 | N-Acétylcystéine     | 1g inj; sol inj 5g/25ml        | X                    | X   | X  | -   | -   | Fluimucil; HIDONAC*                                 |
| 4 | Flumazénil           | 0,5mg/ml inj                   | X                    | X   | X  | -   | -   | Anexate*, Flumazénil AGUETTANT*, Flumazénil MYLAN*, |
| 5 | Neostygmine          | 0,5 mg inj                     | x                    | x   | x  | -   | -   | Prostygmine   |
| 6 | Gluconate de calcium | Injectable :10% ampoule 10mL   | x                    | x   | x  | x   | x   | Gluconate de Calcium B BRAUN*                       |
| 7 | Vitamine K1          | 0,2mL/2mg                      | x                    | x   | x  | x   | x   | Vitamine K1 roche                                   |
| 8 | Dantrolène           | Injectable : 20mg flacon 70 ml | x                    | x   | x  | -   | -   | Dantrium intraveineux                               |
| 9 | Isoprénaline         | inj: amp de 1ml dosée à 0,2mg  | x                    | x   | x  | -   | -   | ISUPREL*  |

5 ANTIEPILEPTIQUES ET ANTICONVULSIVANTS

|   |                     |                          |   |   |   |       |      |  |
|---|---------------------|--------------------------|---|---|---|-------|------|--|
| 1 | Diazépam            | Injectable: 5 mg/ml      | x | x | x | x(U)  | x(U) | Valium, Diazepam<br>RENAUDIN*                                      |
|   |                     | Comprimé : 5 mg et 10 mg | x | x | x | x(U)  | x(U) |  |
| 2 | Midazolam           | Injectable : 5 mg/ml     | x | x | x | -     | -    | Hypnovel, Midazolam AGUETTANT, Midazolam MYLAN*, Midazolam SANDOZ* |
| 3 | Phénobarbital       | Comprimé : 100 mg        | x | x | x | x(U)  | -    | Gardenal, Aparoxal   |
|   |                     | Comprimé : 10 mg         | x | x | x | x(U)  | -    |  |
|   |                     | Comprimé : 50 mg         | x | x | x | x(U)  | -    |  |
|   |                     | injectable : 40 mg/ml    | x | x | x | x(U)  | -    |  |
| 4 | valproate de sodium | Injectable : 100 mg/ml   | x | x | x | x(U)  | -    | Dépakine, valproate de sodium SANDOZ*, valproate                   |
|   |                     | Injectable : 400mg/4ml   | x | x | x | x(DU) | -    |  |



Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)    | PRESENTATIONS ET DOSAGES                | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |       |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|----------------------|---|----------------------|-----|------|-------|-----|---|
|   |                      |   | CHU                  | CHD | HZ   | CSC   | CSA |   |
|   |                      | Comprimé: 200 mg, 500mg                 | x                    | x   | x    | x(DU) | -   | de sodium MYLAN*  |
|   |                      | Sirop : 200 mg/ml                       | x                    | x   | x    | x(DU) | -   |   |
| 5 | Clonazépam           | Injectable : 1 mg/2 ml                  | x                    | x   | x    | -     | -   | Rivotril  |
|   |                      | Comprimé: 2 mg                          | x                    | x   | x    | -     | -   |   |
|   |                      | Gouttes : 2,5 mg/ml                     | x                    | x   | x    | -     | -   |   |
| 6 | Carbamazépine        | Comprimé : 200 mg ; LP200 mg; LP 400 mg | x                    | x   | x    | x(DU) | -   | Carbamazépine MYLAN*,<br>Carbamazépine SANDOZ*<br>Carbamazépine TEVA*<br>Tegretol |
|   |                      | Suspension buvable : 20 mg/ml           | x                    | x   | x    | x(DU) | -   |   |
| 7 | Gabapentine          | 100 mg; 300 mg; 400 mg; 600 mg          | x                    | x   | x(D) | -     | -   | Neurontin*, Gabapentine MYLAN*, Gabapentine SANDOZ*<br>Gabapentine TEVA*          |
| 8 | Lamotrigine          | 50 mg; 100 mg et 200mg comp             | x                    | x   | x(D) | -     | -   | Lamictal*, Lamotrigine MYLAN*, Lamotrigine SANDOZ*, TEVA*                         |
| 9 | sulfate de magnésium | 15% - amp 10 ml inj                     | x                    | x   | x    | x(D)  | -   | Magnésium sulfate   |
|   |                      | 15% - amp 20 ml inj                     | x                    | x   | x    | x(D)  | -   |   |

6 ANTI-INFECTIEUX

6.1 Antibactériens

6.1.1 Pénicillines

|   |                           |                               |   |   |   |   |   |                      |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | Ampicilline <sup>A</sup>  | Injectable: 500 mg et 1000 mg | x | x | x | x | x | Totapen, Rosampline* |
|   |                           | Gélule: 500 mg                | x | x | x | x | x |                      |
| 2 | Amoxicilline <sup>A</sup> | Comprimé et gélule : 500 mg   | x | x | x | x | x | Clamoxyl; Hiconcil   |
|   |                           | Injectable: 1000 mg           | x | x | x | x | x |                      |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|    | DESIGNATION (DCI)                              | PRESENTATIONS ET DOSAGES                                | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                                   |
|----|--|---|----------------------|-----|------|------|-----|--|
|    |  |   | CHU                  | CHD | HZ   | CSC  | CSA |  |
| 3  | Amoxicilline + acide clavulanique <sup>A</sup> | Comprimé: 500mg / 62,5 mg                               | x                    | x   | x    | x(D) | x   | Augmentin, curam, Zamox, Fleming, Enhancin                           |
|    |  | Sachet: 1g/125mg  | x                    | x   | x    | x(D) | x   |  |
|    |  | Injectable: 1g/ 200mg                                   | x                    | x   | x    | x(D) | -   |  |
| 4  | Benzyl pénicilline (Péni G) <sup>A</sup>       | Injectable: 1000000 UI                                  | x                    | x   | x    | x    | x   | Pénicilline G. Bipénicilline   |
|    |  | Injectable: 5000000 UI                                  | x                    | x   | x    | x    | x   |  |
| 5  | Phénoxy méthylpénicilline (PéniV) <sup>A</sup> | Comprimé: 1000 000 UI<br>Suspension buvable: 500 000 UI | x                    | x   | x    | x    | x   | Oспен, Oracilline, Starpen   |
| 6  | Benzathine-benzyl pénicilline <sup>A</sup>     | Injectable: 1200000 UI et<br>2400000 UI                 | x                    | x   | x(D) | x(D) | x   | Extencilline, Dicacilline,<br>Benzathine-benzylpénicilline<br>UBIGEN |
| 7  | Procaïne-benzylpénicilline <sup>A</sup>        | Injectable:4000000 UI                                   | x                    | x   | x    | x    | -   | Retarpen, Pénicilline retard*  |
| 8  | Cloxacilline <sup>A</sup>                      | Comprimé: 250 mg  | x                    | x   | x(D) | x    | x   | Cloxacilline ARROW* ,<br>Orbéline*                                   |
|    |  | Gélule: 500mg   | x                    | x   | x    | x    | x   |  |
|    |  | Injectable: 500 mg et 1000 mg                           | x                    | x   | x(D) | x    | -   |  |
| 8  | Oxacilline <sup>A</sup>                        | Injectable: 1000mg                                      | x                    | x   | x    | -    | -   | Bristopen  |
| 10 | Flucloxacilline <sup>A</sup>                   | Gélule: 500mg   | x                    | x   | x    | x    | -   | Astaph, Staphypen  |

6.1.2 Céphalosporines et carbapénèmes

|   |                           |                                |   |   |      |      |   |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|------|------|---|--|
| 1 | Céfazoline <sup>A</sup>   | 1 g inj                        | x | x | x    | x    | - | Céfacidal*, Kéfol*,<br>Céfazoline MYLAN* |
| 2 | Céfuroxime <sup>A</sup>   | comprimé: 125 mg et 250 mg     | x | x | x(D) | x(D) | - | Cépazine*, Zinnat, Kefrox,<br>Ceftyl     |
|   |                           | susp.buv.: 125 mg/ml           | x | x | x(D) | x(D) | - |  |
| 3 | Céfotaxime <sup>WA</sup>  | 1000 mg et 2000 mg inj         | x | x | x    | -    | - | Claforan, Kefotax,<br>Cefotaxime MYLAN*  |
| 4 | Ceftriaxone <sup>WA</sup> | Injectable : 500 mg et 1000 mg | x | x | x    | -    | - | ROCEPHINE, Lomecef,<br>Accuzon, Mespurin |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|                                    | DESIGNATION (DCI)                            | PRESENTATIONS ET DOSAGES                | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)               |
|------------------------------------|--|---|----------------------|-----|------|------|-----|--|
|                                    |  |   | CHU                  | CHD | HZ   | CSC  | CSA |  |
| 5                                  | Ceftazidime <sup>WA</sup>                    | Injectable : 250 mg; 500 mg et 1000 mg  | x                    | x   | -    | -    | -   | Fortum*, Cetazime, Betazidim, Pretaxime          |
| 6                                  | Impénème (+ Clisatine sodique) <sup>WA</sup> | Injectable 250 mg/250mg ; 500 mg/250 mg | x                    | -   | -    | -    | -   | Bacqur, Tienam                                   |
| <b>6.1.3 Macrolides</b>            |  |   |                      |     |      |      |     |  |
| 1                                  | Erythromycine <sup>WA</sup>                  | Comprimé: 250 mg et 500 mg              | x                    | x   | x    | x    | x   | Ery, Abboticine*, Cary                           |
| 2                                  | Azithromycine <sup>WA</sup>                  | Comprimé: 250 mg et 500 mg              | x                    | x   | x    | -    | -   | Zithromax, Azee, Azithro, Azix Azitrhin, Azicure |
| 3                                  | Clarithromycine <sup>WA</sup>                | Comprimé: 250 mg et 500 mg              | x                    | x   | x    | -    | -   | Naxy, Claritron, Acem, Zeclar                    |
| <b>6.1.4 Aminosides</b>            |  |   |                      |     |      |      |     |  |
| 1                                  | Gentamicine <sup>A</sup>                     | Inj : 40 mg/ml ampoule de 2 ml          | x                    | x   | x    | x(D) | -   | Philco Genta; Gentalline                         |
| 2                                  | Netilmicine <sup>A</sup>                     | Inj : 25mg; 50mg; 100 mg; 150 mg        | x                    | x   | x    | -    | -   | Nétromycine                                      |
| <b>6.1.4 Quinolones</b>            |  |   |                      |     |      |      |     |  |
| 1                                  | Ciprofloxacine <sup>WA</sup>                 | Comprimé : 250 mg; 500 mg; 750 mg       | x                    | x   | x    | x    | x   | Ciproxine, Ciplox, Cetraxal, Cipronat, Bactiflox |
|                                    |  | Injectable: 200mg/ 100 ml sol. Perf.    | x                    | x   | x    | -    | -   |  |
| 2                                  | Ofloxacine <sup>WA</sup>                     | Comprimé: 200 mg et 400 mg              | x                    | x   | x    | -    | -   | Oflocet, Exocine, Ofocine*, Oflocet, Oflox       |
|                                    |  | Injectable: 200 mg                      | x                    | x   | x    | -    | -   |  |
| <b>6.1.5 Autres antibactériens</b> |  |   |                      |     |      |      |     |  |
| 1                                  | Tiamphénicol <sup>A</sup>                    | Injectable : 750 mg et 1000 mg          | x                    | x   | x(D) | x(D) | -   | Thiobactin, Sulfobactin                          |
|                                    |  | comprimé: 250 mg et 500 mg              | x                    | x   | x    | x(D) | -   |  |
| 2                                  | Doxycycline <sup>A</sup>                     | comprimé: 100 mg et 200 mg              | x                    | x   | x    | x    | x   | Doxy-100, Vibramycine, Longamycine, Doxynor,     |
| 3                                  | Tétracycline <sup>A</sup>                    | comprimé: 250 mg                        | x                    | x   | x    | x(U) | -   | Tétramig, Tétracycline                           |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)            | PRESENTATIONS ET DOSAGES         | NIVEAU D'UTILISATION |     |       |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)        |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|-------|------|-----|---|
|   |                              |                                  | CHU                  | CHD | HZ    | CSC  | CSA |   |
|   |                              |                                  |                      |     |       |      |     | CREAT                                     |
| 4 | Cotrimoxazole <sup>A</sup>   | comprimé: 400 mg + 80 mg         | x                    | x   | x     | x    | x   | Bactrim, Eusaprim*,<br>Ulcaprim, Berlocid |
|   |                              | susp buv: 200 mg + 40 mg/5ml     | x                    | x   | x     | x    | x   |   |
| 5 | Métronidazole <sup>A</sup>   | Comprimé: 250 mg et 500 mg       | x                    | x   | x     | x(D) | -   | Flagyl, Tronid, Supplin                   |
|   |                              | comp. vaginal : 100 mg et 500 mg | x                    | x   | x(CD) | x(U) | -   | Flagyl, Flazol, Amibazol                  |
|   |                              | Inj: 500 mg/100 ml sol. en Perf. | x                    | x   | x     | x(D) | -   | Flagyl                                    |
| 6 | Nitrofurantoïne <sup>A</sup> | Comprimé: 50 mg et 100 mg        | x                    | x   | x     | x(D) | -   | Furadantine*, Furadoïne*                  |

**6.2 Antirétroviraux**

**6.2.1 Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse**

|   |            |               |   |   |   |   |   |          |
|---|------------|---------------|---|---|---|---|---|----------|
| 1 | Zidovudine | 300 mg comp   | x | x | x | x | x | Retrovir |
| 2 | Lamivudine | 150 mg comp   | x | x | x | x | x | Epir     |
|   |            | 300mg comp    | x | x | x | x | x |          |
|   |            | 10mg/ml sirop | x | x | x | x | x |          |
| 3 | Abacavir   | 300 mg comp   | x | x | x | x | x | Ziagen   |
| 4 | Ténofovir  | 300 mg comp   | x | x | x | x | x | Viread   |

**6.2.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse**

|   |            |                                     |   |   |   |   |   |            |
|---|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Névirapine | 200 mg comp                         | x | x | x | x | x | Viramune   |
|   |            | 50mg/5ml sirop flacon 240 et 100 ml | x | x | x | x | x |            |
| 2 | Efavirenz  | 600 mg comp                         | x | x | x | x | x | Stocrin    |
| 3 | Etravirine | 200mg comp                          | x | x | x |   |   | Intelence* |

**6.2.3 Inhibiteurs de protéase**

|   |           |                                  |   |   |   |   |   |        |
|---|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| 1 | Ritonavir | Comprimé (thermostable): 100 mg. | x | x | x | x | x | Norvir |
|---|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)                 | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)              |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|   |                                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 2   | Lopinavir + Ritonavir             | 200mg + 50 mg comp       | x                    | x   | x  | x   | x   |   |
| 3   | Atazanavir/ritonavir              | 300mg/100 mg comp        | x                    | x   | x  | x   | x   | Atazor*   |
| 4   | Darunavir/ritonavir               | 600mg/100mg comp         | x                    | x   | x  | -   | -   | Prezista*                                       |
| <b>6.2.4 Inhibiteurs de l'intégrase</b>                           |                                   |                          |                      |     |    |     |     |   |
| 1   | Raltégravir                       | 400mg comp               | x                    | x   | x  | -   | -   | Insentress                                      |
| 2   | Dolutegravir                      | 50mg comp                | x                    | x   | x  | -   | -   | Tivicay*  |
| <b>6.2.5 Associations fixes ou combinaisons à dose fixe (CDF)</b> |                                   |                          |                      |     |    |     |     |   |
| 1   | Zidovudine/Lamivudine             | 300 mg /150mg comp       | x                    | x   | x  | x   | x   | Combivir, Duovir                                |
| 2   | Zidovudine/Lamivudine/névirapine  | 300mg/150mg/200mg comp   | x                    | x   | x  | x   | x   |   |
| 3   | Abacavir/lamivudine               | 600mg/300mg comp         | x                    | x   | x  | x   | x   | Kivexa  |
| 4   | Ténofovir/Lamivudine              | 300mg/300mg comp         | x                    | x   | x  | x   | x   | Tenolam*  |
| 5   | Ténofovir/Lamivudine/Efavirenz    | 300mg/300mg/600mg comp   | x                    | x   | x  | x   | x   | Tenolam-E*                                      |
|   |                                   | 300mg/300mg/400mg comp   | x                    | x   | x  | x   | x   | Tenolam-E400*                                   |
| 6   | Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir | 300mg/300mg/50mg comp    | x                    | x   | x  | x   | x   | Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir<br>Aurobindo* |
| 7   | Ténofovir/Emtricitabine           | 300mg/200mg comp         | x                    | x   | x  | x   | x   | Truvada   |
| 8   | Ténofovir/Emtricitabine/Efavirenz | 300mg/200mg/600mg comp   | x                    | x   | x  | x   | x   | Atripla*  |

**Autres Antiviraux**

|   |            |             |   |   |   |   |   |            |
|---|------------|-------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Aciclovir  | 200 mg comp | x | x | x | x | x | Zovirax    |
| 2 | Ribavirine | 100mg inj   | x | x | x | - | - | ribavirine |

**6.3 Antiparasitaires antiprotozoaires**

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI)                            | PRESENTATIONS ET DOSAGES                                      | NIVEAU D'UTILISATION                |     |    |       |       | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |  |
|--|---|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------------|--|
|  |   | CHU                                 | CHD | HZ | CSC   | CSA   |                                    |  |
| <b>6.3.1 Antipaludiques</b>                  |   |                                     |     |    |       |       |                                    |  |
| 1  | Quinine   | Comprimé: 300 mg                    | x   | x  | x     | x (D) | -                                  | Quinimax, Arsiquinoforme, Surquina       |
|  |   | Injectable: 300 mg ; 600 mg         | x   | x  | x     | x (D) | -                                  |  |
| 2  | Sulfadoxine+pyriméthamine                                     | 500 mg + 25 mg comp                 | x   | x  | x     | x     | x                                  | Fansidar, Maloxine, Combimal, Philco-Max |
| 3  | Artéméther  | injectable: 40 mg/ml ; 80 mg/ml     | x   | x  | x     | x     | x                                  | Artésiane, Malather, Gvither             |
| 4  | Artésunate  | injectable: 60 mg                   | x   | x  | x(L)  | -     | -                                  | Malacef*                                 |
|  |   | capsule rectale: 50 mg              | -   | -  | -     | x     | x                                  | Plasmotrim, Artesiane                    |
| 5  | Arthemether-Luméfantine<br><b>Erreur ! Signet non défini.</b> | comp: 20 mg/120 mg blist de 18      | x   | x  | x     | x     | x                                  | Coartem                                  |
|  |   | comp: 20 mg/120 mg blist de 24      | x   | x  | x     | x     | x                                  |  |
|  |   | comprimé: 80/480mg blist de 6       | x   | x  | x     | x     | x                                  |  |
| 6  | dihydroartémisinine + pipéraquline                            | comprimé: 40/320mg                  | x   | x  | x     | x     | x                                  | Ridmal                                   |
| <b>6.3.2 Anti-amibiens, anti-trichomonas</b> |   |                                     |     |    |       |       |                                    |  |
| 1  | Métronidazole <sup>A</sup>                                    | Comprimé: 250 mg et 500 mg          | x   | x  | x     | x     | x                                  | Flagyl, Tronid, Supplin                  |
|  |   | comp. vaginal : 500 mg              | x   | x  | x(CD) | x(U)  | x                                  | Flagyl, Ovazol                           |
|  |   | Susp. Buv 4%                        | x   | x  | x     | X     | x                                  | Flagyl, Flazol, Amibazol                 |
|  |   | injectable: 500 mg/100 ml Sol. Perf | x   | x  | x     | -     | -                                  | Flazol, Supplin, Flagyl                  |
| 2  | Tinidazole  | Comprimé: 500 mg                    | x   | x  | x     | x(D)  | -                                  | Fasigyne, Tinazol, Trichogin, Amtiba     |
| 3  | Tiliquinol/ Tilbroquinol                                      | gélule: 50/200 mg                   | x   | x  | x     | x     | -                                  | Intétrix                                 |
|  | Secnidazole   | Comprimé: 2g                        | x   | x  | x     | x(D)  | -                                  | Secamib, Secnol                          |
| 5  | Ornidazole  | Comprimé: 2g                        | x   | x  | x     | x     | -                                  | Tibéral                                  |
| <b>6.3.3 Antipaludiques</b>                  |   |                                     |     |    |       |       |                                    |  |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 1 | Eflornithine      | Injectable: 20 mg/ml     | x                    | x   | x  | x   | -   | Ornidyl*                           |
| 2 | Pentamidine       | Injectable: 200 mg       | x                    | x   | x  | x   | -   | Pentacarinat*                      |
| 3 | Mélarsochol       | Injectable: 180mg        | x                    | x   | x  | -   | -   | Arsobal                            |
| 4 | Suramine sodique  | Injectable: 1g           | x                    | x   | x  | -   | -   | MORANYL                            |

**6.4 Antiparasitaires antihelminthiques**

**6.4.1 Antihelminthiques intestinaux**

|   |              |                               |   |   |   |      |   |  |
|---|--------------|-------------------------------|---|---|---|------|---|--|
| 1 | Mébendazole  | Comprimé: 100 mg et 500 mg    | x | x | x | x    | x | Vermox, Carben, Oziben, Mebex                |
|   |              | susp buv 20 mg/ml             | x | x | x | x    | x |  |
| 2 | Praziquantel | Comprimé: 250 mg et 600 mg    | x | x | x | x    | x | Biltricide                                   |
| 3 | Albendazole  | Comprimé: 400 mg et 200 mg    | x | x | x | x    | x | Zentel, Alben, Bendex, Verzol                |
|   |              | susp buv: 400 mg flacon 10 ml | x | x | x | x    | x |  |
| 4 | Flubendazole | Comprimé: 100 mg              | x | x | x | x(D) | - | Fluvermal                                    |
| 5 | Pyrantel     | Comprimé: 125 mg et 250 mg    | x | x | x | -    | - | Combantrin, Helmintox, Combifrinil, Pyrantox |
| 6 | Niclosamide  | Comprimé: 500 mg              | x | x | x | x    | x | Tridémine                                    |

**6.4.2 Antifilariens**

|   |             |                |   |   |   |   |   |                     |
|---|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | Ivermectine | Comprimé: 3 mg | x | x | x | x | x | Mectizan*, Almactin |
|---|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---------------------|

**6.4.3 Schistosomicides**

|   |              |                  |   |   |   |   |   |            |
|---|--------------|------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Praziquantel | Comprimé: 600 mg | x | x | x | x | x | Biltricide |
| 2 | Oxamniquine  | Gélule : 250 mg  | x | x | x | x | x | Vansil*    |

**6.5 Antifongiques**

|   |               |                  |   |   |   |   |   |                                 |
|---|---------------|------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Griséofulvine | Comprimé: 250 mg | x | x | x | x | - | Griséfuline, Griséofulvine PPM, |
|---|---------------|------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES        | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                 |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|--|
|   |                   |                                 | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
|   |                   | pommade : 5%                    | x                    | x   | x  | x   | -   | Griséo   |
| 2 | Nystatine         | Comprimé: 500000 UI             | x                    | x   | x  | x   | x   | Mycostatine  |
|   |                   | comp gynécologique: 100000UI    | x                    | x   | x  | x   | x   |  |
| 3 | Miconazole        | Comprimé: 125 mg                | x                    | x   | x  | x   | x   | Britane*, Daktarin                                 |
|   |                   | Gel buccale : 2%                | x                    | x   | x  | x   | x   |  |
|   |                   | crème                           | x                    | x   | x  | x   | -   | Mycolex  |
| 4 | Fluconazole       | comprimé: 50 mg; 100 mg ;150 mg | x                    | x   | x  | x   | x   | Triflucan, Flucazole,<br>Diflucan, Forcan, Fluomac |
|   |                   | Injectable: 2mg /ml             | x                    | x   | x  | x   | -   |  |
| 5 | Voriconazole      | injectable: 40mg 200mg          | x                    | x   | -  | -   | -   | Vfend  |
| 6 | Clotrimazole      | comprimé: 100 mg et 500 mg      | x                    | x   | x  | x   | x   | Canesten   |
|   |                   | Crème: 1% et 2%                 | x                    | x   | x  | x   | -   | Camysten, Warimazol, Clotri-Denk                   |

**6.6 Antilépreux**

|   |             |                          |   |   |   |   |   |                         |
|---|-------------|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Rifampicine | Gélule: 300 mg           | x | x | x | x | x | MDT-PB adulte NOVARTIS* |
| 2 | Dapsone     | Comprimé: 100 mg         | x | x | x | x | x |                         |
| 3 | Clofazimine | Gélule : 50 mg et 100 mg | x | x | x | x | x |                         |

**6.7 Antituberculeux**

|   |                               |                |   |   |   |   |   |                     |
|---|-------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | Ethambutol (E)                | 400 mg comp    | x | x | x | x | x | Myambutol*          |
| 2 | Isoniazide (H)                | 300 mg comp    | x | x | x | - | - | Rimifon*, Rifater*  |
|   |                               | 100 mg comp    | x | x | x | x | x |                     |
| 3 | Pyrazinamide (Z)              | 400 mg comp    | x | x | x | - | - | Pirilène*           |
| 4 | Rifampicine + Isoniazide (RH) | 150+75 mg comp | x | x | x | x | x | Rifadine + Rimifon* |



Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|    | DESIGNATION (DCI)   | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)      |
|----|---|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|    |   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 5  | Clofazimine   | 100mg comp               | x                    | x   | x  | x   | x   | Lamprène*                               |
| 6  | Etambutol+ Rifampicine + Isoniaside + Pyrazinamide (ERHZ) | 275+150+75 + 400 mg comp | x                    | x   | x  | x   | x   | Rifadine+ Rimifon+ Myambutol+ Pirilène* |
| 7  | Kanamycine  | 1 g inj                  | x                    | -   | -  | -   | -   | Kamycine*                               |
| 8  | Prothionamide   | 250 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   | Ethuoniaside*                           |
| 9  | Ofloxacin <sup>WA</sup>                                   | 400 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   | Oflox                                   |
| 10 | Cyclosérine   | 250 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   | -                                       |
| 11 | moxifloxacin  | 400 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   | Izilox*                                 |
| 12 | Linezolid   | 600 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   |   |
| 13 | Amikacine <sup>A</sup>                                    | 1g inj                   | x                    | -   | -  | -   | -   | Amiklin*                                |
| 14 | Bédaquiline   | 100mg comp               | x                    | -   | -  | -   | -   |   |
| 15 | Acide para-aminosalicylique                               | 4g sachet                | x                    | -   | -  | -   | -   | GRANUPAS                                |
| 16 | Lévofloxacine   | 250 mg comp              | x                    | -   | -  | -   | -   | Levotop                                 |

7 ANTIMIGRAINEUX

|   |                    |                              |   |   |      |   |   |                                    |
|---|--------------------|------------------------------|---|---|------|---|---|------------------------------------|
| 1 | Dihydroergotamine  | 5 mg gélule                  | x | x | x(D) | - | - | Seglor, Dihydroergotamine NOVARTIS |
|   |                    | 2 mg/ml solution buvable     | x | x | x(D) | - | - |                                    |
| 2 | Sumatriptan        | 50mg comp                    | x | x | x    | - | - | Sumatriptan*, Imigram comp*        |
| 3 | Zolmitriptan       | 2,5 mg; 5mg; 15mg; 45mg comp | x | x | x    | - | - | Zomig, Zomig Oro                   |
| 4 | Propranolol        | 40mg; 160mg comp             | x | x | x    | - | - | Avlocardyl (ECG avant)             |
| 5 | Ergotamine+caféine | comprimé : 1mg + 100 mg      | x | x | x    | - | - | Gynergène caféiné                  |
| 6 | Pizotifène         | Comprimé : 0,50mg            | x | x | x    | - | - | Sanmigran                          |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |

8 CYTOTOXIQUES ET IMMUNOSUPPESSEURS

|    |                  |  |   |   |   |   |   |                          |
|----|------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 1  | Docétaxel        | Injectable: 20mg et 80 mg  | x | - | - | - | - | Taxotère                 |
| 2  | Vinorelbine      | Injectable: 10 mg/ ml ; 50 mg /5ml   | x | - | - | - | - | Navelbine                |
| 3  | Cytarabine       | Inj : 100mg; 500 mg; 1g; 2g poudre   | x | - | - | - | - | Aracytine                |
| 4  | Oxaliplatine     | Injectable : 50mg/10ml FI 10ml;<br>100mg/20ml FI 20ml; 200mg/40ml FI 40ml<br>Poudre pour inj : 50mg; 100mg | x | - | - | - | - | Oxaliplatine KABI*       |
| 5  | Carboplatine     | Injectable : 50mg/5ml ; 150mg/15ml;<br>450mg/45ml ; 600mg/60ml   | x | - | - | - | - | Carboplatine KABI*       |
| 6  | Paclitaxel       | Poudre pour injection : 6mg/ml;<br>100mg/17ml  | x | - | - | - | - | Taxol* Paxene*           |
| 7  | Etoposide        | Gélule : 100 mg<br>Injectable : 100 mg/5ml l   | x | - | - | - | - | Celltop* Etopophos*      |
| 8  | Bicalutamide     | Comprimé : 50 mg   | x | - | - | - | - | Casodex*                 |
| 9  | Procarbazine     | Gélule: 50 mg  | x | - | - | - | - | Caryolysine, Natulan*    |
| 10 | Fludarabine      | Comprimé: 10 mg (pelliculé)  | x | - | - | - | - | Fludara*                 |
| 11 |                  | Injectable: 50 mg/10 ml  | x | - | - | - | - |                          |
| 12 | Doxorubicine     | Inj: 10mg / 5 ml; 50 mg /25 ml   | x | - | - | - | - | Adriblastine             |
| 13 | Cisplatine       | Inj: 10 mg / 10 ml; 25 mg / 25 ml<br>50mg/50ml   | x | - | - | - | - | Cisplatyl*               |
| 14 | Cyclophosphamide | Injectable: 500 mg ; 1 g   | x | - | - | - | - | Andoxan                  |
| 15 | Méthotrexate     | Injectable: 25 mg ; 50 mg  | x | - | - | - | - | Méthotrexate*, Novatrex* |
| 16 | Vincristine      | Injectable: 1mg/ml   | x | - | - | - | - | Vincristine, Oncovin*    |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|                                    | DESIGNATION (DCI)     | PRESENTATIONS ET DOSAGES                        | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                |
|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|                                    |                       |   | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 17                                 | Bléomycine            | Injectable:15mg                                 | x                    | -   | -  | -   | -   | Bléomycine*, Bléomycine TEVA*, Bléomycine BELLON* |
| 18                                 | Pamidronate de sodium | Injectable:60 mg ; 90 mg                        | x                    | -   | -  | -   | -   | Arédia*   |
| 19                                 | Hydroxycarbamide      | 500 mg gelule                                   | x                    | -   | -  | -   | -   | Hydréa*   |
| 20                                 | 5 Fluoro-uracile      | Injectable: 250 mg; 500 mg                      | x                    | -   | -  | -   | -   | Fluorouracile*                                    |
| 21                                 | Epirubicine           | 50mg  | x                    | -   | -  | -   | -   | Farmorubicine                                     |
| 22                                 | acide zolédronique    | 4mg /100ml inj                                  | x                    | -   | -  | -   | -   | Zometra*, Zolnic*                                 |
| 23                                 | Melfalan              | 2 mg comp                                       | x                    | -   | -  | -   | -   | Alkeran*  |
| 24                                 | Gemcitabine           | Inj: 200g FI/10 ml; 1000 mg FI/50 ml            | x                    | -   | -  | -   | -   | Gemzar*   |
| 25                                 | ciclosporine          | Injectable: 50 mg                               | x                    | -   | -  | -   | -   | SANDIMMUN*  |
| 26                                 | acide mycophénolique  | comprimé: 500                                   | x                    | -   | -  | -   | -   | MOFETYL*  |
| 27                                 | Trastuzumab           | Injectable: Flacon de 150 mg                    | x                    | -   | -  | -   | -   | HERCEPTIN*  |
| 28                                 | Thalidomide           | comprimé : 50 mg 100mg                          | x                    | -   | -  | -   | -   | Thalidomide                                       |
| 29                                 | Bortézomib            | injectable 1mg 3,5mg                            | x                    | -   | -  | -   | -   | Velcade   |
| 30                                 | Tacrolimus            | 0,5mg 1mg 2mg 5mg                               | x                    | -   | -  | -   | -   | Prgraf  |
| 31                                 | Azathioprine          | 50mg  | x                    | -   | -  | -   | -   | Imurel  |
| 30                                 | Capecitabine          | comprimé: 150 mg et 500 mg                      | x                    | -   | -  | -   | -   | Xeloda*   |
| <b>Adjuvant des antimitotiques</b> |                       |   |                      |     |    |     |     |   |
| 1                                  | Ondansétron           | 4mg et 8 mg comprimé; 2mg/ml inj; 4mg/5ml sirop | x                    | -   | -  | -   | -   | ZOPHREN*  |
| 2                                  | Aprépitant            | gélule 80mg et 125 mg                           | x                    | -   | -  | -   | -   | EMEND*  |
| 3                                  | Filgrastim            | Injectable: 0,3mg/ml                            | x                    | -   | -  | -   | -   | Neupogen*   |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)    | PRESENTATIONS ET DOSAGES  | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                      |                           | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 1 | Trihexyphénidyle     | Comprimé : 5 mg           | x                    | x   | -  | -   | -   | Artane*, Parkinane*                |
| 2 |                      | Injectable : 10 mg        | x                    | x   | -  | -   | -   |                                    |
| 3 | Lévodopa + carbidopa | Comprimé : 100 mg + 10 mg | x                    | x   | -  | -   | -   | Sinemet*                           |
| 4 |                      | Comprimé : 250 mg + 25 mg | x                    | x   | -  | -   | -   |                                    |
| 5 | Tropatépine          | Comprimé : 10 mg          | x                    | x   | -  | -   | -   | Lepticur*                          |
| 6 | Piribédil            | Comprimé : 50mg LP        | x                    | x   | x  | -   | -   | Trivastal                          |

**10 MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LE SANG**

**10.1 Antianémiques**

|   |                   |                                |   |   |      |   |      |   |
|---|-------------------|--------------------------------|---|---|------|---|------|---|
| 1 | Acide folique     | Comprimé: 5 mg                 | x | x | x    | x | x    | Foldine, Acfol, Spécialfoldine*                       |
| 2 | Fumarate de fer   | Comprimé: 200 mg               | x | x | x    | x | x    | Fumafer, Ferro-Denk, Tardyferon 80, Ferrostrane sirop |
|   |                   | poudre pour suspension: 100 mg | x | x | x    | x | x(U) |   |
|   |                   | sirop: 0,68%                   | x | x | x    | x | x    |   |
|   |                   | injectable: 100 mg/ 2 ml       | x | x | x    | - | -    | Hémafer, Encifer                                      |
| 3 | Hydroxocobalamine | 1 mg/2ml inj                   | x | x | x(D) | - | -    | Dodécavit, Vitamine B12 GERDA                         |
| 4 | Erythropoïétine   | 2000 UI; 6000UI; 10000 UI      | x | - | -    | - | -    | EPO; Recormon   |

**10.2 Anticoagulants et antagonistes**

|   |                     |  |   |   |   |   |   |                                |
|---|---------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | Héparine sodique    | Injectable : 25000UI/5ml                       | x | x | x | - | - | héparine sodique               |
|   |                     | Injectable : 5000 UI/ml                        | x | x | x | - | - |                                |
| 2 | Enoxaparine sodique | Injectable: 20 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg; 100 mg | x | x | x | - | - | Lovenox, Novex, Troynoxa, Enox |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)    | PRESENTATIONS ET DOSAGES            | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |       | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-------|------------------------------------|
|   |                      |                                     | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA   |                                    |
| 3 | Acenocoumarol        | Comprimé quadriséable : 4 mg        | x                    | x   | x  | -   | -     | Sintrom, Mini-sintrom*             |
| 4 | Fluidione            | comprimé quadriséable : 20mg        | x                    | x   | x  | -   | -     | Previscan                          |
| 5 | Sulfate de protamine | 10 mg/ml, inj.                      | x                    | x   | x  | -   | -     | Protamine*, Protamine CHOAY*       |
| 6 | Phytoménadione       | 2mg/0,2ml inj/ gouttes buvables     | x                    | x   | x  | x   | x (M) | Vitamine K1                        |
|   |                      | 10 mg/ 1 ml, inj./ gouttes buvables | x                    | x   | x  | x   | x (M) |                                    |
| 7 | Acide tranexamique   | Comprimé : 500 mg                   | x                    | x   | x  | x   | x     | Exacyl, Spotof*                    |
|   |                      | Ampoule buvable : 1g/10 ml          | x                    | x   | x  | x   | x     |                                    |
|   |                      | Injectable : 0,5g/5ml               | x                    | x   | x  | x   | x     |                                    |

**10.3 Fibrinolytiques et Antiaggrégants plaquettaires**

|   |                         |  |   |       |   |   |   |                             |
|---|-------------------------|--|---|-------|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Streptokinase           | Injectable: 250.000UI ; 750.000 UI; 1.500.000 UI | x | x (D) | - | - | - | Streptase*, Kabikinase*     |
| 2 | rt-PA ( Altéplase)      | 20mg injec 20ml                                  | x | x (D) | - | - | - | Actilyse*                   |
| 3 | Acide acétylsalicylique | Comprimé : 100mg                                 | x | x     | x | x | x | Aspirine; Aspegic, Kardegic |
| 4 | Rivaroxaban             | 10mg 15mg 20mg                                   | x | x     | - | - | - | Xarelto                     |
| 5 | clopidogrel             | 75 mg comp                                       | x | x     | x | - | - | Plavix* , Nugrel,           |

**11 DERIVES ET SUCCEDANES DU SANG**

**11.1 Succédanés du plasma**

|   |   |                            |   |   |   |   |   |                        |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1 | Dextran 70                              | Sol. à 6%, inj             | x | x | x | x | x | Hémodex*, Réomacrodex* |
| 2 | Hydroxyéthylamidon + Chlorure de Sodium | poche de 500ml inj         | x | x | x | - | - | Voluven                |
| 3 | Gélatine fluide modifiée isotonique     | 30 g/l - flacon 500 ml inj | x | x | x | - | - | Haemacel, Plasmion*    |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |

12 MEDICAMENTS DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

12.1 Anti-angoreux

|   |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinitrate d'isosorbide | Comprimé sublingual : 5 mg                  | x | x | x | x | - | Risordan*, Langoran*, Monicor*                        |
| 2 | Trinitrate de glycérol | comp sublingual: 500µg                      | x | x | x | x | - | Glycéryl, Trinitrine, Myonit                          |
|   |                        | solution pour pulvérisation buccale: 0,4 mg | x | x | x | - | - | Trinitrine Merck*                                     |
|   |                        | patch à 5 mg/24 h; 10 mg/24 h               | x | x | x | - | - | Trinipatch*   |
| 3 | Aténolol               | comprimé: 50 mg ; 100 mg                    | x | x | x | x | - | Ténormine, Atenolol Denk, Tensicard, Novaten, Blokium |
|   |                        | Injectable: 5 mg/10 ml                      | x | x | x | x | - |   |

12.2 Anti-arythmiques

|   |             |             |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Propranolol | 40 mg comp  | x | x | - | - | - | Avlocardyl,                                     |
| 2 | Amiodarone  | 200 mg comp | x | x | - | - | - | Cordarone, Amiodarone SANDOZ*, Amiodarone TEVA* |
| 3 |             | 150 mg inj  | x | x | - | - | - |   |

12.3 Antihypertenseurs

|   |                     |                         |   |   |      |       |   |  |
|---|---------------------|-------------------------|---|---|------|-------|---|--|
| 1 | Hydrochlorothiazide | Comprimé : 25 mg        | x | x | x    | x     | - | Esidrex  |
| 2 | Méthylidopa         | Comprimé : 250 mg       | x | x | x    | x(DU) | - | Aldomet, Mequibar*, Dopanore                     |
| 3 | Clonidine           | Injectable : 0,15 mg/ml | x | x | x(D) | x(DU) | - | Catapressan                                      |
| 4 | Nifédipine          | Comprimé : 20 mg        | x | x | x(D) | x     | - | Adalat, Nifelat, Nifcal, Nifédi-Denk             |
| 5 | Captopril           | Comprimé : 25mg, 50mg   | x | x | x    | x     | x | Lopril, Captolane, Captopril Denk, Captipril EG* |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|    | DESIGNATION (DCI)      | PRESENTATIONS ET DOSAGES         | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)            |
|----|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|    |                        |                                  | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 6  | Amlodipine             | Comprimé : 5 mg ; 10mg           | x                    | x   | x  | x   | x   | Amlor, Lopine, Amlopress, Amapine             |
| 7  | Nicardipine            | gélule : 50 mg                   | x                    | x   | x  | x   | x   | Loxen   |
|    |                        | Injectable : 10 mg/ml            | x                    | x   | x  | -   | -   |   |
| 8  | Indapamide             | Comprimé: 1,5 mg et 2,5 mg       | x                    | x   | x  | -   | -   |   |
| 9  | Périndopril            | Comprimé : 2mg ; 4 mg ; 8 mg     | x                    | x   | x  | -   | -   | Coversyl, Acepril                             |
| 10 | Enalapril              | Comprimé : 5 mg; 20 mg           | x                    | x   | x  | -   | -   | Renitec, Enalapril TEVA*, Enalapril BIOGARAN* |
| 11 | Losartan               | Comprimé : 25 mg; 50 mg ; 100 mg | x                    | x   | x  | -   | -   | Cozaar*, Zaat, Losar Denk                     |
| 12 | Vérapamil              | Comprimé : 40mg ; 80 mg          | x                    | x   | x  | -   | -   | Isoptine, Vera-Denk                           |
| 13 | Bisoprolol             | Comprimé : 5 mg ; 10mg           | x                    | x   | x  | -   | -   | Cardiocr*, Détensiel, Lodoz                   |
| 14 | Lisinopril             | Comprimé : 5 mg ; 20mg           | x                    | x   | x  | -   | -   | Prinivil*, Zestril*, Lizopril                 |
| 15 | Dinitrate d'isosorbide | Injectable : 10 mg/ml            | x                    | x   | x  | x   | -   | Risordan*, Langoran*, Monicor*                |

**12.4 hypolipémiants**

|   |               |                                 |   |   |   |   |   |                                    |
|---|---------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Atorvastatine | Comprimé: 10 mg ; 20 mg ; 40 mg | x | x | x | - | - | Tahor, Atorlip, Vastator, Lesstrol |
| 2 | Simvastatine  | Comprimé :10 mg ; 20mg ; 40 mg  | x | x | x | - | - | Zocor, Simva-Denk, Nocol           |

**12.5 Glycosides cardiotoniques**

|   |          |                   |   |   |      |   |   |  |
|---|----------|-------------------|---|---|------|---|---|--|
| 1 | Digoxine | comprimé 0,25 mg  | x | x | x(D) | - | - | Digoxine Nativelle*, Dogoxine SANDOZ*, Hemigoxine Nativelle* |
|   |          | injectable 0,5 mg | x | x | x(D) | - | - |  |

**12.6 Médicaments utilisés contre le choc et/ou l'anaphylaxie**

|   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopamine | injectable: amp de 5ml de 200mg (40mg/ml) | x | x | - | - | - | Dopamine, Dopamine-Biotis, Dopamine MYLAN*, Dopamine AGUETTANT* |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)      | PRESENTATIONS ET DOSAGES                  | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|------------------------|---|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|   |                        |   | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 2 | Epinéphrine/Adrénaline | injectable: amp de 1ml dosée à 1mg et 5mg | x                    | x   | x  | -   | -   | Anahelp*, Alapen*/Adrénaline, Adrénaline AGUETTANT*, Adrénaline RENAUDIN* |
| 3 | Dobutamine             | injectable: amp de 250 mg                 | x                    | x   | -  | -   | -   | Dobutrex*   |

12.7 Vasodilatateur

|   |               |             |   |   |   |   |   |           |
|---|---------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|
| 1 | Naftidrofuryl | 200 mg comp | X | X | X | - | - | Praxilene |
|---|---------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|

13 MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES

13.1 Antifongiques

|   |                                     |                                    |   |   |   |      |   |  |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------|---|--|
| 1 | Acide benzoïque + acide salicylique | pommade à (6% + 3%)                | x | x | x | x(D) | - | acide benzoïque et acide salicylique       |
| 2 | Miconazole                          | lotion à 2%                        | x | x | x | x    | - | Daktarin                                   |
|   |                                     | gel buccal à 2%                    | x | x | x | x    | - |  |
| 3 | Fluconazole                         | Comprimé: 50 mg; 100 mg; 150 mg    | x | x | x | x    | - | Triflucan, Flucess, Forcan                 |
|   |                                     | suspension buvable: 50 mg          | x | x | x | x    | - | Flucazole                                  |
| 4 | Clotrimazole                        | 2% crème                           | x | x | x | x    | - | Canesten, Camysten, Warimazol, Clotri-Denk |
| 5 | Amphotéricine B                     | 10% poudre pour suspension buvable | x | x | x | x    | - | Fungizone                                  |

13.2 Anti-infectieux

|   |                         |                           |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Néomycine + bacitracine | 5 mg + 500 UI/5 g pommade | x | x | x | x | - | Néomycine-Bacitracine*   |
| 2 | Violet de gentiane      | solution aqueuse à 1/1000 | x | x | x | x | x | Violet de gentiane, Violet de gentiane SERHANE*, Violet de gentiane VALDAFRIQUE* |



**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 3 | Eosine aqueuse    | solution aqueuse à 2%    | x                    | x   | x  | x   | x   | Eosine aqueuse Gilbert*            |

**13.3 Anti-inflammatoires et antiprurigineux**

|   |                   |                       |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Betaméthasone     | pommade à 0,1%, 0,05% | x | x | x | x | - | Betneval, Célestoderm*,<br>Diprolène*, Diprosone                                     |
|   |                   | crème à 0,1%, 0,05%   | x | x | x | x | - |  |
| 2 | Acide salicylique | crème à 5 %           | x | x | x | x | - | Algésal, Algipan, Vaseline salicylé de VALDAFRIQUE*,<br>Vaseline salicylé de COOPER* |

**13.4 Kératoplastiques et Kératolytiques**

|   |                    |               |   |   |   |   |   |                     |
|---|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | Goudron de houille | pommade à 10% | x | x | x | x | - | Ichtyol*, Ichtamol* |
|---|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---------------------|

**13.5 Scabicides et pédiculocides**

|   |                    |        |   |   |   |   |   |                     |
|---|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | Benzoate de benzyl | lotion | x | x | x | x | x | Ascabiol, Acaribial |
| 2 | Perméthrine        | lotion | x | x | x | x | - | A-PAR, Para poux    |

**14 PRODUITS A USAGE DIAGNOSTIQUE**

**14.1 Ophtalmologie**

|   |              |                          |   |   |   |   |   |               |
|---|--------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 1 | Tropicamide  | gouttes ophtamiques 0,5% | x | x | x | - | - | Mydriaticum   |
| 2 | Fluorescéine | 0,5% gouttes             | x | x | x | - | - | Fluorescéine* |
|   |              | bandelette               | x | x | x | - | - |               |

**14.2 Substances de contraste radiologiques**

|   |                           |                                      |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulfate de baryum         | inj: 150 ml suspension               | x | x | x | - | - | Micropaque, Télébar*,<br>Micropaque scanner*  |
|   |                           | 400g poudre                          | x | x | x | - | - |   |
| 2 | Ioxitalamate de méglumine | Inj: 250 mg/ml; 300 mg/ml; 350 mg/ml | x | x | x | - | - | Télébrix hystéro; Télébrix 30;<br>Télébrix 35 |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)                   | PRESENTATIONS ET DOSAGES           | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                                     |                                    | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 3 | Iodine 38%                          | 480 mg/ml 10 ml inj                | x                    | x   | x  | -   | -   | Lipiodol ultra fluide              |
| 4 | Ioxaglate de sodium et de méglumine | inj: 320 mg/ml, FI 20 ml et 50 ml  | x                    | x   | x  | -   | -   | Hexabrix 320, Radiosélectan        |
| 5 | Adipiodon de méglumine              | flacon 250 ml                      | x                    | x   | x  | -   | -   | Transbilix (Sup)                   |
| 6 | Acide gadotérique                   | Solution inj 0,5 mmol/ml en FI/5ml | x                    | -   | -  | -   | -   | Dotarem                            |
| 7 | Ioxitalamate de sodium              | 120 mg/ml flacon 250 ml inj        | x                    | x   | x  | -   | -   | Télébrix 12                        |

15 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

|   |                            |  |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Alcool                     | 70%  | x | x | x | x | x | Alcool   |
| 2 | Cémtrimide + Chlorhexidine | 15% + 1,5% solution                            | x | x | x | x | x | Cetavlon + Hibitane*   |
| 3 | chlorhexidine digluconate  | 20% + 1,5% solution                            | x | x | x | x | x | Hibitane Eludril*  |
| 4 | Eosine aqueuse             | 2% solution aqueuse                            | x | x | x | x | x | Eosine aqueuse Gilbert*  |
| 5 | Formaldéhyde               | 0,5 g comp                                     | x | x | x | x | x | Formol Serhane*  |
| 6 | Permanganate de potassium  | 0,5 g comp                                     | x | x | x | x | x | Permanganate de potassium, Permanganate de potassium Serhane*, Permanganate de potassium Pharmaquick |
| 7 | Povidone iodée             | 10% solution dermique 125ml, 500ml             | x | x | x | x | x | Betadine   |
|   |                            | 10% tulle gras                                 | x | x | x | x | x |  |
|   |                            | 10% gel tube 30g                               | x | x | x | x | x |  |
|   |                            | 4% solution moussante dermique                 | x | x | x | x | x |  |
|   |                            | 10% solution pour bain de bouche et gargarisme | x | x | x | x | x |  |
|   |                            | 5% solution oculaire                           | x | x | x | x | x |  |
|   |                            | 250 mg ovule gynécologique                     | x | x | x | x | x |  |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|   | DESIGNATION (DCI)      | PRESENTATIONS ET DOSAGES   | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                        |                            | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
|   |                        | 10% solution gynécologique | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 8 | Hypochlorite de sodium | 500mg/ 100ml solution      | x                    | x   | x  | x   | x   | Dakin COOPER,                      |
| 9 | Glutaraldéhyde         | 20% solution               | x                    | x   | -  | -   | -   | Verutal*, Cidex*,<br>Glutaral*     |

16 DIURETIQUES

|   |                |                               |   |   |      |   |   |  |
|---|----------------|-------------------------------|---|---|------|---|---|--|
| 1 | Furosémide     | Comprimé : 20mg, 40 mg        | x | x | x    | x | x | Lasilix, Furo Denk, Furilan  |
|   |                | Injectable : 20 mg/2ml        | x | x | x    | x | x | Furilan, Furosémide TEVA*,<br>Furosémide RENAUDIN*                                 |
| 2 | Mannitol       | Injectable : 10%, 500 ml      | x | x | x    | - | - | Mannitol, Mannitol BBRAUN*   |
|   |                | Injectable 20%, 30%; 500 ml i | x | x | x    | - | - |  |
| 3 | Spironolactone | Comprimé : 25 mg , 50mg, 75mg | x | x | x(D) | - | - | Aldactone, Spiroctan gélule*,<br>Spironolactone TEVA*,<br>Spironolactone BIOGARAN* |

17 MEDICAMENTS DU TUBE DIGESTIF

17.1 Anti-acides et autres anti-ulcéreux

|   |                                   |  |   |   |      |   |   |  |
|---|-----------------------------------|--|---|---|------|---|---|--|
| 1 | Cimétidine                        | Comprimé: 200 mg ; 400 mg                            | x | x | x(D) | x | - | Tagamet, Philco cimo,<br>Antagon H2  |
| 2 | Hydroxyde d'aluminium + magnésium | Comprimé: 400 mg<br>Suspension buvable: (525+600 mg) | x | x | x    | x | x | Maalox, Gastromag,<br>Gastrogel, Hydroxyde<br>d'aluminium + Magnésium<br>CREAT, Mutesa |
| 3 | Ranitidine                        | Comprimé: 150 mg                                     | x | x | x    | x | - | Azantac, Rani Denk,<br>Rubiulcer, Ranimat,<br>Antagonine, Ranitic                      |
| 4 | Oméprazole                        | Comprimé: 20 mg                                      | x | x | x    | x | - | Mopral, Gasec, Omesafe,<br>Gaspral, Ompranyl, Lomac,<br>Omemac                         |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 5 | Lanzoprazole      | Comprimé: 30 mg          | x                    | x   | x  | x   | -   | Lansec, Lanzor, Monolitum          |
| 6 | Rabéprazole       | Comprimé: 20 mg          | x                    | x   | x  | x   | -   | Rabémac, Fizo, Pariet*             |

**17.2 Anti-émétiques**

|   |                |                                 |   |   |      |   |   |            |
|---|----------------|---------------------------------|---|---|------|---|---|------------|
| 1 | Métoclopramide | Comprimé: 10 mg                 | x | x | x(D) | x | x | Primpéran, |
|   |                | Injectable: 5 mg/ml             | x | x | x(D) | x | x |            |
| 2 | lévosulpiride  | Comprimé: 25mg                  | x | x | x    | - | - | Dislep     |
|   |                | Injectable: 25mg                | x | x | x    | - | - |            |
| 3 | Métopimazine   | Injectable: 10 mg/ml            | x | x | x    | x | x | Vogalène,  |
|   |                | Comprimé lyophilisé: 7,5 mg     | x | x | x    | x | - |            |
|   |                | susp buv 1 mg/ml, flacon 150 mg | x | x | x    | x | - |            |
|   |                | Sirop: 0,1%                     | x | x | x    | x | x |            |
|   |                | solution buv: 0,4%              | x | x | x    | x | x |            |
|   |                | Suppositoire: 5 mg              | x | x | x    | x | x |            |

**17.3 Anti-hémorroïdaires**

|   |  |                                 |   |   |   |   |   |              |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | Carraghénanates+ oxyde de titane +oxyde de zinc                        | crème rectale: (2,5 + 2+2) mg   | x | x | x | x | - | Titanoréine  |
|   |  | suppositoires: (300+200+400) mg | x | x | x | x | - |              |
| 2 | Dodéclonium + Enoxolone +Benzocaïne                                    | crème rectale: 400mg+0,93g+2g   | x | x | x | x | - | Sédorroïde   |
|   |  | suppositoires: (1,3+23+50) mg   | x | x | x | x | - |              |
| 3 | Fraction flavonoïque purifiée  | comprimé: 1g                    | x | x | x | x | x | DAFLON       |
| 4 | Hépéridine méthyl-chalcone+ acide ascorbique+ extrait ruscus aculeatus | amp buv: 150/100mg<br>gélule    | x | x | x | x | x | Cyclo 3 fort |

**17.4 Anti-spasmodiques**

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)           | PRESENTATIONS ET DOSAGES                      | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-----------------------------|---|----------------------|-----|------|------|------|------------------------------------|
|   |                             |   | CHU                  | CHD | HZ   | CSC  | CSA  |                                    |
| 1 | Butylscopolamine            | comprimé: 10 mg                               | x                    | x   | x    | x    | x    | Buscopan<br>Algo-buscopan*         |
|   |                             | injectable: 10 mg/ml                          | x                    | x   | x    | x    | x    |                                    |
| 2 | Méthyl sulfate de Tiemonium | injectable: 5 mg/2 ml                         | x                    | x   | x    | x    | x    | Viscéralgine                       |
|   |                             | sirop: 0,2 g                                  | x                    | x   | x    | x    | x    |                                    |
| 3 | Phloroglucinol              | comprimé: 80 mg                               | x                    | x   | x(U) | x(U) | x(U) | Spasfon, Kinafon, Gynospan         |
|   |                             | injectable: 40mg                              | x                    | x   | x(U) | x(U) | -    |                                    |
|   |                             | 150 mg suppositoire                           | x                    | x   | x(U) | x(U) | x(U) |                                    |
| 4 | Drotavérine                 | comprimé: 40mg ; 80mg<br>Injectable: 40mg/2ml | x                    | x   | x    | x    | x    | No-spa                             |

**17.5 Cathartiques**

|   |               |                                      |   |   |   |   |   |                             |
|---|---------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Lactulose     | buvable et sachet: 10g/15ml solution | x | x | x | x | x | Duphalac, Transilac, Laxose |
| 2 | Paraffine     | buvable et sachet: 250g              | x | x | x | x | x | Lubentyl, lansoyl           |
| 3 | Macrogol 4000 | sachet: 4g                           | x | x | x | x | x | Forlax                      |

**17.6 Médicaments et préparations contre la diarrhée**

|   |            |                                 |   |   |   |   |   |              |
|---|------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | Lopéramide | 2mg comp                        | x | x | x | x | x | Imodium      |
| 2 | SRO + Zinc | sachet pour 1 litre de solution | x | x | x | x | x | Orasel zinc* |

**18 SPERMICIDES**

|   |                      |                          |   |   |   |   |   |              |
|---|----------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | Nonoxynol-9          | comprimé vaginal: 150 mg | x | x | x | x | - | Conceptrol   |
| 2 | Menfegol             | comprimé vaginal: 60 mg  | x | x | x | x | - | Néo Sampooon |
| 3 | Monalazone disodique | comprimé vaginal: 9,5 mg | x | x | x | x | - | Septon       |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES   | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |  | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 4 | Benzalkonium      | comprimé vaginal:<br>capsule molle 18,9mg ,<br>mini-ovule 18,9 mg e,<br>ovule: 18,9 mg ,<br>crème vaginale: 54 mg ; 1,2% | x                    | x   | x  | x   | -   | Pharmatex                          |

**19 HORMONES**

**19.1 HORMONES HYPOTHALAMIQUES**

**19.1.1 Agoniste de la LH-RH**

|   |              |                                      |   |   |   |   |   |            |
|---|--------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Triptoreline | Injectable :3mg ; 11,25 mg           | x | x | - | - | - | Decapeptyl |
| 2 | Leuproreline | Injectable : 3,75mg; 11,25 mg; 30 mg | x | x | - | - | - | Enantone   |
| 3 | Gosereline   | Injectable :3,6mg; 10,8 mg           | x | x | - | - | - | Zoladex    |

**19.1.2 HORMONES DE CROISSANCE**

|   |             |                                     |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Somatropine | Injectable : 0,6 mg 0,8mg; 10mg/2ml | x | - | - | - | - | Genotonorm*, Norditropine*,<br>Omnitrop* |
| 2 | Mécasermine | injectable: 10mg/ml flacon de 4 ml  | x | - | - | - | - | INCRELEX*                                |

**19.2 HORMONES HYPOPHYSAIRES**

|   |             |                         |   |   |   |   |   |         |
|---|-------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | FSH purifié | Injectable :50UI ; 75UI | x | - | - | - | - | Puregon |
|---|-------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---------|

**19.3 HORMONES THYROIDIENNES**

|   |                   |                            |   |   |   |   |   |              |
|---|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | Carbimazole       | Comprimé : 5mg ; 20mg      | x | x | x | - | - | Neomercazole |
| 2 | Thiamazole        | Comprimé : 5mg ;10mg ;20mg | x | x | x | - | - | Thyrozol     |
| 3 | Thiouracile       | Comprime : 25mg            | x | x | x | - | - | Basdène      |
|   |                   | Comprime :50mg             | x | x | x | - | - | Propylex     |
| 4 | Lévothyroxine LT4 | Solution buvable 150µg     | x | x | x | - | - | L-Thyroxine  |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|             | DESIGNATION (DCI)  | PRESENTATIONS ET DOSAGES                 | NIVEAU D'UTILISATION             |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |  |
|-------------|--|--|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|--|
|             |  |  | CHU                              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |  |
|             |  | Comprime : 100 µg ;200 µg, 25 µg ; 50 µg | x                                | x   | x  | -   | -   | Levothyrox                         |  |
| <b>19.4</b> | <b>HORMONES PANCREATIQUES</b>                                      |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | 1  | Insuline rapide                          | Injectable: 100 UI/ml, 10 ml     | x   | x  | x   | x   | x                                  | Actrapid HM Insuline, Insultard HM, , Mixtard 30HM |
|             | 2  | Insuline retard                          | Injectable: 100 UI/ml, 10 ml     | x   | x  | x   | x   | x                                  |  |
|             | 3  | Insuline semi-retard                     | Injectable: 100 UI/ml, 10 ml     | x   | x  | x   | x   | x                                  |  |
|             | 4  | Glucacon                                 | 1mg /ml poudre pour solvant inj  | x   | x  | -   | -   | -                                  | Glucagen*  |
| <b>19.5</b> | <b>HORMONES SURRENALIENNES</b>                                     |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | 1  | Fludrocortisone                          | Comprime : 50 µg                 | X   | X  | -   | -   | -                                  | Flucortac*   |
| <b>19.6</b> | <b>GLUCOCORTICOIDES</b>  |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | Voir Anti inflammatoires stéroïdiens (2.3.2)                       |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
| <b>19.7</b> | <b>CATECHOLAMINES SURRENALIENNES (voir également section 12.6)</b> |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | 1  | Noradrenaline                            | amp de 4ml dosée à 4mg           | x   | x  | x   | -   | -                                  | Levophed   |
| <b>19.8</b> | <b>HORMONES OVARIENNES</b>   |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | 1  | Estradiol                                | Comprimé : 1mg,2mg               | x   | x  | x   | -   | -                                  | Progynova  |
|             |  |  | Percutané (sachet dose) : 0,5 mg | x   | x  | x   | -   | -                                  | Delidose*  |
|             | 2  | Estradiol+ Cyproterone                   | Comprimé : 4mg + 1 mg            | x   | x  | x   | -   | -                                  | Climène  |
|             | 3  | Estriol                                  | Comprimé :1mg                    | x   | x  | x   | -   | -                                  | Physiogine*  |
|             |  |  | Crème : 0,1%                     | x   | x  | x   | -   | -                                  | Trophigil; Trophycrème*                            |
| <b>19.9</b> | <b>ANTI-HORMONES OVARIENNES</b>                                    |  |                                  |     |    |     |     |                                    |  |
|             | 1  | Tamoxifène                               | Comprimé 20mg, 10 mg             | x   | -  | -   | -   | -                                  | Novaldex*  |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

|         | DESIGNATION (DCI)                 | PRESENTATIONS ET DOSAGES    | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                          |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|---|
|         |                                   |                             | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| 2       | Anastrozole                       | comprimé 1mg                | x                    | -   | -  | -   | -   | Arimidex*   |
| 19.9.1  | <b>Progesteron e naturelle</b>    |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 1       | Dydrogestérone                    | Cp : 10mg                   | x                    | x   | x  | -   | -   | Duphaston   |
| 2       | Progestérone                      | Capsule : 100 mg; 200 mg    | x                    | x   | x  | -   | -   | Utrogestan  |
|         |                                   | injectable : 25 mg solution | x                    | x   | x  | -   | -   | Progiron*   |
| 19.9.2  | <b>Progestatifs de synthese</b>   |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 1       | Medrogestone                      | Comprime : 5mg              | x                    | x   | x  | -   | -   | colprone  |
| 2       | Nomegestrol                       | Comprimé : 3,5mg,5mg        | x                    | x   | x  | x   | -   | Lutenyl   |
| 3       | Promegestone                      | Comprimé : 0,125mg ;0,250mg | x                    | x   | -  | -   | -   | Surgestone  |
| 19.10   | <b>HORMONES TESTICULAIRES</b>     |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 1       | Testosterone                      | Comprime: 40 mg             | x                    | x   | -  | -   | -   | pantestone  |
|         |                                   | Injectable: 250 mg/1 ml     | x                    | x   | -  | -   | -   | Androtardyl   |
| 19.11   | <b>ANTI ANDROGENES</b>            |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 1       | Acetate de cyproterone            | Comprime : 50mg             | x                    | x   | x  | -   | -   | Androcur, Erapyl  |
| 2       | Nilutamide                        | Comprime : 50mg; 150 mg     | x                    | -   | -  | -   | -   | Anandron*   |
| 3       | Bicalutamide                      | Comprimé : 50 mg            | x                    | -   | -  | -   | -   | Casodex   |
| 4       | Flutamide                         | Comprime : 250 mg           | x                    | -   | -  | -   | -   | Flutamide MYLAN*  |
| 19.11   | <b>CONTRACEPTIFS</b>              |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 19.11.1 | <b>CONTRACEPTIFS ORAUX</b>        |                             |                      |     |    |     |     |   |
| 1       | Ethinylestradiol + levonorgestrol | comprimé: 0,03mg + 0, 15mg  | x                    | x   | x  | X   | -   | Adépal, Minidril, Microgynon, Combi 3, Microlut, Lofemenal* |



**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)               |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|------|------|-----|--|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD | HZ   | CSC  | CSA |  |
| 2 | Noréthistérone    | comprimé:10mg            | x                    | x   | x    | X    | -   | Primolut Nor (N'est plus fabriqué en France)     |
| 3 | Levonorgestrel    | comprimé: 0,03mg; 1,5 mg | x                    | x   | x    | X    | -   | Microval, Norlevo, Protect Pill, Vikela, Secufem |
| 4 | Ethinylestradiol  | comprimé: 0,05mg         | x                    | x   | x(D) | x(D) | -   | Harmonie, Laafia*                                |

**19.11.2 CONTRACEPTIFS INJECTABLES**

|   |                                |  |   |   |   |   |   |                            |
|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Acétate de Médroxyprogestérone | Injectable: 150 mg/3ml ;<br>Injectable 104mg/0,65ml seringue<br>préremplie | x | x | x | x | - | Sayana press; Dépo-Provera |
| 2 | Noréthistérone                 | Injectable: 200 mg/ml  | x | x | x | x | - | Noristérat                 |
| 3 | Progestérone                   | 250 mg/ml inj  | x | x | x | x | - | Progestérone               |

**19.11.3 LES IMPLANTS**

|   |                |                         |   |   |   |      |   |          |
|---|----------------|-------------------------|---|---|---|------|---|----------|
| 1 | Levonorgestrel | Batonnet souple : 75 mg | x | x | x | x(C) | - | Jadelle  |
| 2 | Lévonorgestrel | batonnet:               | x | x | x | x(C) | - | Norplant |

**20 PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES**

**20.1 Sérums et immunoglobulines**

|   |                               |   |      |      |      |      |      |                                |
|---|-------------------------------|---|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1 | Sérum antirabique             | inj. (Fab)2 200-400 UI pour 1 ml        | x(R) | x(R) | x(R) | -    | -    | Sérum antirabique;<br>Favirab* |
| 2 | Sérum antitétanique           | Injectable: 1500 UI/ml                  | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Tetanea*                       |
| 3 | Sérum antivénimeux lyophilisé | injectable: 200 mg de protéines totales | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Sérum antivénimeux             |
| 4 | Antivenin de serpent          | Poudre lyophilisée                      | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Inoserp panafricain            |
| 5 | sérum anti D                  | injectable: 300 µg/ 2ml                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Rhoclon*; Rophylac             |

**20.2 Vaccins**

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)                             | PRESENTATIONS ET DOSAGES   | NIVEAU D'UTILISATION |      |      |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|---|
|   |   |  | CHU                  | CHD  | HZ   | CSC  | CSA  |   |
| 1 | Vaccin rabique Humain inactivé                | injectable: poudre et solvant 1 dose<br>flacon 0,5 ml  | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Vaccin rabique PASTEUR  |
| 2 | Vaccin antitétanique (anatoxine<br>tétanique) | injectable: 1 dose ;10 doses FI/0,5 ml   | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Tétavat, VAT, Vaccin<br>tétanique PASTEUR,<br>Tetavax                       |
| 3 | Vaccin anti pneumococcique                    | injectable: 1 dose   | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Pneumo 23,  |
| 4 | Vaccin antiamaril                             | injectable: 1 dose ; multidoses FI/0,5 ml  | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Stamaril*   |
| 5 | vaccin antiméningococcique                    | injectable: poudre et solvant pour<br>suspension injectable 1 dose ;<br>multidoses FI/0,5 ml | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Vaccin<br>antiméningococcique,<br>vaccin polysidique<br>meningococcique A+C |
| 6 | Vaccin anti-hépatite B                        | injectable: 20µg/ml seringue préremplie  | x(R)                 | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Vaccin<br>anti-hépatite B, Tritanrix-<br>HB, Euvax-B, Engerix-B             |

**21 MYORELAXANTS**

|   |                        |                  |   |   |   |   |   |                               |
|---|------------------------|------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Thiocolchicoside       | 4 mg comp        | x | x | x | x | - | Coltramy,<br>Miorel, Myoplège |
| 2 | Adenosine triphosphate | 30 mg gélule     | x | x | x | x | - | Atépadène                     |
| 3 | Mephenesine            | Comprime : 500mg | x | x | x | x | - | Decontractyl                  |
|   |                        | Pommade          | x | x | x | x | - |                               |

**22 PREPARATIONS OPHTALMOLOGIQUES**

**22.1 Anti-infectieux**

|   |              |                      |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tétracycline | pommade opt : 1% 5 g | x | x | x | x | x | Tétramig (Auréomycine =<br>Chlortétracycline) |
| 2 | Rifamycine   | collyre : 1% 10 ml   | x | x | x | x | x | Rifamycine, Rifamycine                        |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)            | PRESENTATIONS ET DOSAGES     | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                              |                              | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
|   |                              | pommade opht : 1% 5 g        | x                    | x   | x  | x   | x   | CHIBRET                            |
| 3 | Aciclovir                    | Comprimé : 200mg, 800mg      | x                    | x   | x  | -   | -   | Zovirax, Alvir, Aciclovir          |
|   |                              | pommade opht : 3%            | x                    | x   | x  | -   | -   |                                    |
| 4 | Gentamicine <sup>A</sup>     | injectable : 40mg/ml         | x                    | x   | x  | -   | -   | Gentalline, Gentamycine            |
|   |                              | solution ophtalmique : 0,3 % | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 5 | Ciprofloxacine <sup>WA</sup> | Collyre : 0,3%               | x                    | x   | x  | x   | x   | Ciplox, Spectrum, Ciloxan          |
| 6 | Hexamidine                   | Collyre : 0,1%               | x                    | x   | x  | -   | -   | Désoméline                         |

**22.2 Anti-inflammatoires**

|   |               |                      |   |   |   |   |   |             |
|---|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| 1 | Betaméthasone | Injectable : 4 mg/ml | x | x | x | - | - | Célestène   |
| 2 | Indométacine  | Collyre: 0,1%        | x | x | x | x | x | Indocollyre |

**22.3 Associations anti infectieux-Anti-inflammatoires**

|   |                                 |                              |   |   |   |   |   |                         |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Néomycine + dexaméthasone       | 1% solution opht             | x | x | x | - | - | Chibro Cadron, Maxidrol |
| 2 | Tobramycine + dexaméthasone     | collyre: 0,1% + 0,3%         | x | x | x | - | - | Tobradex                |
| 3 | Oxytétracycline + dexaméthasone | pommade: 0,267 mg + 1,335 mg | x | x | x | - | - | Sterdex*                |
| 4 | Prednisolone                    | collyre: 1%                  | x | x | x | - | - | Otipred*                |

**22.4 Anesthésiques locaux**

|   |                            |                      |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Oxybuprocaine chlorhydrate | Collyre : 1%         | x | x | x | - | - | Novésine*,<br>Oxybuprocaine*,<br>Cébésine*                   |
| 2 | Lidocaïne                  | injectable : 2%      | x | x | x | - | - | Xylocaïne  |
|   |                            | gel ophtalmique : 5% | x | x | x | - | - |  |
| 3 | Tétracaïne                 | collyre : 1%         | x | x | x | - | - | Tétracaïne Fort*   |
| 4 | Bupivacaïne                | Injectable : 0,5 %   | x | x | x | - | - | Marcaïne*, Bupivacaïne<br>AGUETTANT*,<br>Bupivacaïne BIOTIS* |

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

| DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |

22.5 Myotiques et Antiglaucomateux

|   |               |                    |   |   |   |   |   |                             |
|---|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Pilocarpine   | Collyre : 2%       | x | x | x | - | - | Isopto pilocarpine          |
| 2 | Timolol       | Collyre : 0,25%    | x | x | x | - | - | Timoptol, Cusinolol, Nyolol |
|   |               | Collyre : 0,5 %    | x | x | x | - | - |                             |
| 3 | Acétazolamide | Comprimé : 250mg   | x | x | x | - | - | Diamox                      |
|   |               | injectable : 500mg | x | x | x | - | - | Diamox                      |
| 4 | Dorzolamide   | Collyre :          | x | x | x | - | - | Trusopt                     |
| 5 | Latanoprost   | Collyre : 0,005%   | x | x | x | - | - | Zalatan, Lacoma             |

22.6 Mydriatiques

|   |                    |                    |   |   |   |   |   |               |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 1 | Sulfate d'Atropine | Collyre : 1% 10 ml | x | x | x | - | - | Atropine      |
| 2 | Tropicamide        | Collyre : 0,5%     | x | x | x | - | - | Mydriaticum   |
| 3 | phényléphrine      | Collyre : 10%      | x | x | x | - | - | Néosinéprine* |

22.7 Antiallergiques

|   |                                     |                |   |   |   |   |   |                              |
|---|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|------------------------------|
| 1 | acide N- acetyl aspartyl glutamique | Collyre : 4,9% | x | x | x | x | - | Naabak                       |
| 2 | cromoglycate de sodium              | Collyre : 2%   | x | x | x | x | - | Opticron, Cromoptic, Cromsol |
| 3 | levocabastine                       | Collyre : 0,5% | - | - | - | - | - | Levophta                     |

23 OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES

23.1 Ocytociques

|   |                     |                                    |      |      |      |        |        |                                |
|---|---------------------|------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------------------------------|
| 1 | Ergométrine maléate | Comprimé: 0,2 mg                   | x    | x    | x    | -      | -      | Méthergin; <b>ERGOMETRINE</b>  |
|   |                     | injectable: 0,2 mg/ml; 0,5 mg/ml   | x(R) | x(R) | x(R) | x(MRU) | -      |                                |
| 2 | Oxytocine           | injectable: 5 UI/ml; 10 UI/ml, inj | x(R) | x(R) | x(R) | x(MRU) | x(MRU) | Synthocinon, Oxytocine BIOTIS* |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |      |      |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|------------------------------------|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD  | HZ   | CSC  | CSA  |                                    |
| 3 | Misoprostol       | Comprimé: 200 µg         | x                    | x    | x(D) | x(D) | x(D) | Cytotec                            |
| 4 | Dinoprostone      | gel vaginal 1mg; 2mg     | x(R)                 | x(R) | -    | -    | -    | Prostine*                          |

**23.2 Anti-Ocytociques**

|   |            |                             |      |      |       |            |  |  |
|---|------------|-----------------------------|------|------|-------|------------|--|--|
| 1 | Salbutamol | Comprimé: 0,5 mg; 2mg; 4 mg | x    | x    | x(D)  | x          |  | Ventoline, buto Asma,<br>Respiry-2, Salbutamol<br>TEVA** |
|   |            | 4 mg suppositoire           | x(R) | x(R) | x(RD) | x(RM<br>D) |  |  |

**24 PSYCHOTROPES**

**24.1 Neuroleptiques**

|   |                       |                                      |   |      |      |   |   |   |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|------|------|---|---|---|
| 1 | Levomépromazine       | Comprimé : 25 mg ; 100 mg            | x | x    | x(D) | - | - | Nozinan   |
|   |                       | Injectable : 25 mg/ml                | x | x    | x(D) | - | - |   |
| 2 | Chlorpromazine        | Comprimé : 25 mg ; 100 mg            | x | x    | x(D) | - | - | Largactil   |
|   |                       | Injectable : 25 mg/5 ml ; 50mg/2ml   | x | x    | x(D) | - | - |   |
| 3 | Halopéridol           | Comprimé : 5 mg ; 10 mg              | x | x    | x(D) | - | - | Haldol, Haldol décanoas                           |
|   |                       | gouttes : 1%                         | x | x    | x(D) | - | - |   |
|   |                       | Injectable : 5 mg/ml                 | x | x    | x(D) | - | - |   |
| 4 | Tiapride              | 100 mg comp                          | x | x(D) | x(D) | - | - | Tiapridal   |
|   |                       | 100 mg /2 ml inj                     | x | x(D) | x(D) | - | - |   |
| 5 | Risperidone           | Comprimé: 2 mg; 0,5mg                | x | x(D) | x(D) | - | - | Risperdal*, Risperdalconsta<br>LP*, Risperdaloro* |
| 6 | Flufénazine décanoate | solution huileuse injectable 25mg/ml | x | x(D) | x(D) | - | - | Modécat*, moditen*                                |

**24.2 Tranquillisants**

|   |                          |                                  |   |   |      |      |   |                    |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|------|------|---|--------------------|
| 1 | Diazépam                 | Comprimé: 5 mg ; 10 mg           | x | x | x(D) | x(D) | x | Valium ROCHE       |
| 2 | Clorazépate dipotassique | Gélule: 5 mg; 10mg; 15 mg; 50 mg | x | x | x(D) | x(D) | - | Tranxène, Noctran* |

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 3 | Lorazépam         | Comprimé: 1mg et 2,5mg   | x                    | x   | x  | x   | -   | Temesta                            |

**24.3 Antidépresseurs**

|   |               |                                |   |   |      |   |   |                               |
|---|---------------|--------------------------------|---|---|------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Amitriptyline | Comprimé: 25 mg; 50 mg         | x | x | x(D) | - | - | Laroxyl, Elavil*              |
|   |               | Injectable: 5mg/ml             | x | x | x(D) | - | - |                               |
|   |               | sol buv 40 mg/ml               | x | x | x(D) | - | - |                               |
| 2 | Clomipramine  | Comprimé: 10 mg ; 25 mg; 75 mg | x | x | x(D) | - | - | Anafranil                     |
|   |               | injectable: 25 mg/2 ml         | x | x | x(D) | - | - |                               |
| 3 | Imipramine    | comprimé: 25 mg                | x | x | x(D) | - | - | Tofranil*                     |
|   |               | 25 mg inj                      | x | x | x(D) | - | - |                               |
| 4 | paroxétine    | comprimé: 20 mg                | x | x | x(D) | - | - | Déroxat, Divarius*, Saropide* |

**24.4 Les correcteurs**

|   |                  |                        |   |   |      |   |   |                          |
|---|------------------|------------------------|---|---|------|---|---|--------------------------|
| 1 | Trihexyphénidyle | comprimé: 2 mg et 5 mg | x | x | x(D) | - | - | Artane, Parkinane LP*    |
| 2 | Tropatépine      | comprimé: 5 mg         | x | x | x(D) | - | - | Lepticur, Lepticur Park* |

**25 MEDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE**

**25.1 Solution nasale**

|   |                     |                  |   |   |   |   |   |            |
|---|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Serum physiologique | solution à 0,9 % | x | x | x | x | x | Physiodose |
|---|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|------------|

**25.2 Vasoconstricteurs**

|   |               |                                |   |   |   |   |   |                    |
|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| 1 | Oxymetazoline | Spray buccal : flacon de 20 µg | x | x | x | x | x | Aturgyl, xylomepha |
|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|

**25.3 Anticholinergiques**

|  |             |                           |   |   |   |   |   |  |
|--|-------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  | Ipratropium | Nasal 0,03%               | x | x | x | - | - |  |
|  |             | Sparay buccal FI de 20 µg | x | x | x | - | - |  |

**25.4 Corticoïdes**

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES     | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                              | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 1 | Fluticasone       | Pulverisation nasale :50 µg  | X                    | X   | X  | -   | -   | Flixonase                          |
| 2 | Mometazone        | Pulverisation nasale : 50 µg | X                    | X   | X  | -   | -   | Nasonex                            |
| 3 | Triamcinolone     | Pulverisation nasale :55 µg  | X                    | X   | X  | -   | -   | Nasocort                           |
| 4 | Budesonide        | Pulverisation nasale :64 µg  | X                    | X   | X  | -   | -   | Rhinocort                          |

**25.5 Antitussifs**

|   |                  |                        |   |   |   |   |   |                  |
|---|------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------------|
| 1 | Dextrometorphane | Solution buv. : 2mg/ml | x | x | x | x | x | Drill toux sèche |
|---|------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------------|

**25.6 Mucorégulateurs**

|   |                  |                              |   |   |   |   |   |                           |
|---|------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 1 | Carbocistéine    | solution buvable: 2%         | x | x | x | x | x | Fluditec, Rhinatiol       |
| 2 | N-Acétylcystéine | granulés pour sol buv: 200mg | x | x | x | x | x | Exomuc, Drill toux grasse |
| 3 | Ambroxol         | solution buvable: 0,6%       | x | x | x | x | x | broxol, Muxol             |

**25.7 Anti-asthmatique**

|   |                |   |   |   |   |   |   |                     |
|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | Salbutamol     | Spray : 100µg/dose<br>injectable : 0,5mg/ml | x | x | x | x | x | Ventoline, Asthalin |
| 2 | Beclométhasone | aérosol : 250µg/dose                        | x | x | x | - | - | BECOTIDE            |
| 3 | Budesonide     | suspension pour inhalation : 0,5mg/2ml      | x | x | x | - | - | Pulmicort           |
| 4 | Terbutaline    | Injectable : 0,5mg                          | x | x | x | - | - | BRICANYL            |
|   |                | Comprime : 50mg                             | x | x | x | - | - |                     |
|   |                | Aerosol : 0,5mg                             | x | x | x | - | - |                     |

**26 SOLUTIONS DESTINEES A CORRIGER LES PERTURBATIONS DE L'EQUILIBRE HYDRIQUE, ELECTROLYTIQUE ET ACIDO-BASIQUE**

**26.1 Pour la voie orale**

|   |                                    |                                 |   |   |   |   |   |                    |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| 1 | Sels de réhydratation orale + Zinc | Sachet pour 1 litre de solution | x | x | x | x | x | Orasel*, SRO-Zinc* |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|

**26.2 Pour la voie parentérale**

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)               | PRESENTATIONS ET DOSAGES                              | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---------------------------------|---|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                                 |   | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 1 | Bicarbonate de sodium           | 1,4% amp 10 ml inj                                    | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 2 | Serum bicarbonaté               | Perfusion: 1,4% - FI/250 ml ; 500 ml                  | x                    | x   | x  | x   | x   | Serum bicarbonaté Baxter           |
| 3 | Chlorure de potassium           | 2g amp 10 ml inj                                      | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 4 | Chlorure de sodium              | injectable: sol amp 10% ; 20 %                        | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 5 | Serum Salé                      | injectable sol pour perf: 0,9% flacon 250 ml ; 500 ml | x                    | x   | x  | x   | x   | Chlorure de sodium B Braun         |
| 6 | Serum glucosé                   | 5% flacon 250 ml Perfusion                            | x                    | x   | x  | x   | x   | Dextrose                           |
|   |                                 | 5% flacon 500 ml Perfusion                            | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
|   |                                 | 10% flacon 250 ml Perfusion                           | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
|   |                                 | 10% flacon 500 ml Perfusion                           | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
|   |                                 | 30% flacon 250 ml Perfusion                           | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
|   |                                 | 30% flacon 500 ml Perfusion                           | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 7 | Lactate de sodium composé       | flacon 250 ml Perfusion                               | x                    | x   | x  | x   | x   | Ringer lactate, Darrow*            |
|   |                                 | flacon 500 ml Perfusion                               | x                    | x   | x  | x   | x   |                                    |
| 8 | Eau pour préparation injectable | solution pour perf.: 2 ml, 5 ml; 10 ml                | x                    | x   | x  | x   | x   | EPPI B BRAUN*                      |

**27 VITAMINES ET SELS MINERAUX**

**27.1 Vitamines**

|   |   |                                |   |   |   |   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | Rétinol                                     | comprimé: 25000 UI ; 100000 UI | x | x | x | x | x | Vitamine A, Arovit*, Avibon    |
| 2 | Pyridoxine                                  | Comprimé: 250 mg               | x | x | x | x | x | Vitamine B6 RICHARD*, Becilan* |
|   |   | injectable: 250 mg/5ml         | x | x | x | x | x |                                |
| 3 | Acide ascorbique                            | comprimé: 500 mg               | x | x | x | x | x | Laroscorbine, Vitamine C       |
| 3 |   | injectable: 500 mg             | x | x | x | x | x |                                |
| 4 | Multivitamine (Vitamines: A, D3, E, B1, B6, | comprimé                       | x | x | x | x | x | Vicombil, Alvityl, Arginotri B |



**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI)                | PRESENTATIONS ET DOSAGES | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)   |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|------|-----|--------------------------------------|
|   |                                  |                          | CHU                  | CHD | HZ | CSC  | CSA |                                      |
|   | B12, C, B3, B9, B5, Calcium)     | sirop                    | x                    | x   | x  | x    | x   | comp,                                |
| 5 | Vitamine B complex (B1, B6, B12) | injectable :             | x                    | x   | x  | x    | x   | Bécozyme Princi B fort,<br>Becidouze |
| 6 |                                  | comprimé :               | x                    | x   | x  | x    | x   |                                      |
| 7 | Alpha-Tocophérol (Vit E)         | Gélule: 400UI, 500 mg    | x                    | x   | x  | x    | x   | E flavyl ; TOCO 500                  |
| 8 | Cyanocobalamine (Vit B12)        | injectable: 1000 µg/4ml  | x                    | x   | x  | x(D) |     | Vitamine B12 Gerda                   |

**27.2 Sels minéraux**

|   |                              |                                  |   |   |   |   |   |                                    |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Chlorure de calcium (CaCl)   | injectable: amp 100 mg/ml, 10 ml | x | x | x | x | x | Chlorure de Calcium<br>RENAUDIN*   |
| 2 | Chlorure de potassium (KCl)  | injectable: amp 10% (0,1g/ml)    | x | x | x | x | x | Chlorure de potassium B.<br>Braun* |
| 3 | Chlorure de magnésium (MgCl) | injectable: amp 10% (0,1g/ml)    | x | x | x | x | x | Chlorure de magnésium<br>RENAUDIN* |

**28 AUTRES MEDICAMENTS**

**28.1 Traitement de fond des rhumatismes inflammatoires chroniques**

|   |                    |                          |   |   |   |   |   |  |
|---|--------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Méthotrexate       | 2,5 mg comp              | x | - | - | - | - | Novatrex*, Ledertrexate*,<br>Methothrexate BELLON* |
|   |                    | sous cutané              | x | - | - | - | - |  |
| 2 | Hydroxychloroquine | 200 mg comp              | x | - | - | - | - | Plaquenil*   |
| 3 | Sulfasalazine      | 500 mg comp              | x | - | - | - | - | Salazopyrine*                                      |
| 4 | Azathioprine       | 25 mg comp et 50 mg comp | x | - | - | - | - | Imurel*  |
|   |                    | 50 mg poudre sol inj     | x | - | - | - | - |  |

**28.2 Les antispastiques**

|   |                           |                   |   |   |   |   |   |            |
|---|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | Toxine botulinique type B | 5000 U/ml sol inj | x | - | - | - | - | Neurobloc* |
|---|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|------------|

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale**

|   | DESIGNATION (DCI) | PRESENTATIONS ET DOSAGES          | NIVEAU D'UTILISATION |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |                   |                                   | CHU                  | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| 2 | Baclofène         | 0,05 mg/1 ml sol inj intrathécale | x                    | -   | -  | -   | -   | Liorésal*                          |

**28.3 Traitement de l'hépatite**

28.3.

1

**Antiviraux**

|  |                         |  |   |   |   |   |   |                   |
|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------|
|  | Ténofovir               | comp 245mg   | x | x | - | - | - | Viread            |
|  | Sofosbuvir+ Ledipasvir  | comprimé 400mg/90 mg                                 | x | x | - | - | - | SOVALDI* HARVONI* |
|  | Sofosbuvir+ Velpatasvir | comprimé 400mg/100 mg                                | x | x | - | - | - | EPCLUSA*          |
|  | Sofosbuvir              | comp 400   | x | x | - | - | - | Sofos, ofopas     |
|  | Ribavirine              | 100mg inj<br>200mg et 400mg comp;<br>40mg/ml sol buv | x | x | - | - | - | Copegus, Rebetol* |

28.3.

2

**Interféron pégylés**

|   |                    |                                |   |   |   |   |   |               |
|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 1 | Interferon alfa-2a | 180 microgrammes sol inj       | x | - | - | - | - | Pegasys*      |
| 2 | Interferon alfa-2b | 80 et 100 microgrammes sol inj | x | - | - | - | - | Viraferonpeg* |

NB : \* = Produit non enregistré au Bénin

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination  
Commune Internationale**

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                  | FORMES ET DOSAGES                             | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| <b>1. ANESTHESIQUES</b>                      |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>1.1 Anesthésiques Généraux et oxygène</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>1.1.1 Gaz halogénés</b>                   |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Halothane                                    | inhalation: flacon de 250 ml                  | x                | x   | x  | -   | -   | Fluothane                          |
| Isoflurane                                   | inhalation: flacon de 250 ml                  | x                | x   | x  | -   | -   | Forène*                            |
| Sevoflurane                                  | Inhalation: 100mg flacon de 100ml             | x                | x   | x  | -   | -   | SEVORANE                           |
| <b>1.1.2 Autres gaz</b>                      |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Oxygène                                      | Inhalation (gaz médical)                      | x                | x   | x  | X   | -   | oxygène                            |
| MEOPA  | inhalation                                    | X                | X   | X  | -   | -   | Kalinox                            |
| <b>1.1.3 Anesthésiques Injectables</b>       |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Kétamine                                     | 50mg/ml injectable                            | x                | x   | x  | -   | -   | Kétalar*                           |
| Thiopental sodique                           | ampoule injectable dosee a 0,5g , 1 g amp inj | x                | x   | x  | -   | -   | Nesdonal                           |
| Midazolam                                    | amp injectable dosee à 5mg/mL et 1mg/mL       | x                | x   | x  | -   | -   | Hypnovel*                          |
| Propofol                                     | 10 mg/ml ; 20 mg/ml injectable                | x                | -   | -  | -   | -   | Diprivan                           |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|---|------------------|-----|------|-----|-----|------------------------------------|
|  |   | CHU              | CHD | HZ   | CSC | CSA |                                    |
| Etomidate                                    | 2mg/ml, inj   | x                | x   | x    | -   | -   | Hypnomidate*                       |
| <b>1.1.4 Les curares</b>                     |   |                  |     |      |     |     |                                    |
| Chlorure de suxamethonium (succinyl choline) | Poudre pour préparation injectable: (chlorure) en flacon.<br>Solution injectable: 50 mg (chlorure)/ml en ampoule de 2 ml. | x                | x   | x    | -   | -   | Celocurine ;Suxamethonium          |
| Atracurium                                   | Injectable :10mg/mL ; 25mg/2,5mL  | x                | x   | x    | -   | -   | Tracrium                           |
| Pancuronium                                  | Injectable : 2mg/ml, ampoule de 2mL   | x                | x   | x    | -   | -   | Pavulon                            |
| Vecuronium                                   | Injectable : 4mg/mL ;10mg/mL  | x                | x   | x    | -   | -   | Norcuron                           |
| <b>1.1.5 Anesthésiques locaux</b>            |   |                  |     |      |     |     |                                    |
| Bupivacaïne                                  | 0,25%, 0,5% flacon 20 ml; 50 ml inj et 20 mg/4ml  | x                | x   | x    | -   | -   | Marcaïne*                          |
| Bupivacaïne + épinéphrine                    | 0,5% et 2% inj  | x                | x   | x    | -   | -   | Marcaïne+ adrénaline*              |
| Bupivacaïne hyperbare                        | 0,5%/4ml  | x                | x   | x(c) | -   | -   | MARCAINE* hyperbare                |
| Lidocaïne                                    | injectable: 2% capsule de 1,8 ml  | x                | x   | x    | x   | -   | Xylocaïne                          |
|  | injectable: 2% flacon 20 ml ; 1% flacon 20ml  | x                | x   | x    | x   | -   |                                    |
|  | injectable: 2% flacon 50 ml   | x                | x   | x    | x   | -   |                                    |
|  | gel 5% oral   | x                | x   | x    | -   | -   |                                    |
| lidocaïne + epinephrine (adrénaline)         | Cartouche dentaire à 2%<br>solution injectable à 1% et 2%   | x                | x   | x    | -   | -   | Xylocaïne + adrénaline             |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|---|------------------|-----|------|-----|-----|---|
|   |   | CHU              | CHD | HZ   | CSC | CSA |   |
|   | spray 5%  | x                | x   | x    | x   | x   |   |
| Ropivacaïne   | injectable: 2mg/ml, 10ml ou 20ml                            | x                | x   | x    | -   | -   | Naropéine*  |
|   | injectable: 7,5mg/ml, 10ml ou 20ml                          | x                | x   | x    | -   | -   |   |
|   | injectable: 10mg/ml, 10ml ou 20ml                           | x                | x   | x    | -   | -   |   |
| Mepivacaïne   | injectable: 1% , 2% carpule de 1,8ml                        | x                | x   | x(c) | -   | -   | CARBOCAINE*   |
| <b>Adjuvants</b>  |   |                  |     |      |     |     |   |
| Ephedrine   | injectable: ampoule de 1ml dosé à 30mg                      | x                | x   | x    | -   | -   | Ephedrine AGUETTANT*  |
| <b>2. ANTALGIQUES ET MEDICAMENTS DES SOINS PALLIATIFS</b> |   |                  |     |      |     |     |   |
| <b>2.1 Antalgiques non opioïdes</b>                       |   |                  |     |      |     |     |   |
| Paracétamol   | Comprimé: 500mg   | x                | x   | x    | x   | x   | Claradol, Dafalgan,<br>Efferalgan; doliprane;<br>Perfalgan,<br>Paracetamol, Perfaldis,<br>Genpar, Perfaldis |
|   | Suppositoire: 80 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg; 300 mg; 600 mg | x                | x   | x    | x   | x   |   |
|   | injectable: 10mg/ml sol pr perf, flacon de 50 ml et 100 ml  | x                | x   | x    | x   | x   |   |
|   | Sirop: 125mg /5 ml  | x                | x   | x    | x   | x   |   |
| Acide acétylsalicylique                                   | Comprimé: 100mg ; 250 mg et 500 mg                          | x                | x   | x    | x   | x   | Aspirine Winthrop;  |
| Acétylsalicylate de DL-lysine                             | Injectable: 1g et 500 mg poudre pour solution injectable    | x                | x   | x    | x   | -   | Aspégic   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                      | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |      |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)   |
|----------------------------------|---|------------------|------|------|-----|-----|--|
|                                  |   | CHU              | CHD  | HZ   | CSC | CSA |  |
| Tramadol                         | 50 mgLP gélule, 100mgLP, comp effervescent, Solution buvable<br>Injectable : 100mg/amp 2ml)                             | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   | TRABAR, ZAMUDOL<br>gélule, TRAMADIS<br>inj, Contramal  |
| <b>2.2 Analgésiques opioïdes</b> |   |                  |      |      |     |     |  |
| Codeine +Paracétamol             | Comprime : 500mg/30mg   | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   | Klipal codéine, dafalgan<br>codeine  |
| Buprenorphine                    | injectable: 0,3 mg  | x                | x    | x(D) | -   | -   | Temgésic   |
|                                  | Comprimé: 0,2 mg  | x                | x    | x(D) | -   | -   |  |
| Nalbuphine                       | injectable: Ampoule 20mg/2mL  | x                | x    | x(D) | -   | -   | NUBAIN   |
| Morphine chlorhydrate            | omprimé/gélule: 5mg , 10mg , 20mg, 30mg   | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   | Skénan* (10,20,30mg)<br>,ActiSkenan(5,10,20mg);<br>Morphine chlorhydrate<br>AGUETTANT*<br>Morphine chlorhydrate<br>COOPER*; Moscontin* |
|                                  | Comprimé: 10mg LP   | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   |  |
|                                  | Comprimé: 30mg LP   | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   |  |
|                                  | Comprimé: 60mg LP, 100 mg LP  | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   |  |
|                                  | solution buvable:10mg/ 5ml  | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   |  |
|                                  | Injectable: 10 mg/ml ampoule de 1 ml, hydromorphone et oxycodone<br>peuvent être utilisés en alternative de la morphine | x(D)             | x(D) | x(D) | -   | -   | Morphine   |
| Fentanyl                         | Injectable : 0,5mg/mL en 10mL ;0,1mg /mL en 2mL   | x                | x    | X(D) | -   | -   | Fentanyl , Actiq*,<br>Fentanyl SANDOZ*,<br>Durogesic*,Abstral  |
|                                  | Comprimé sublingual : 133 µg; 267 µg et 400 µg  | X                | X    | X(D) | -   | -   |  |
| Sufentanil                       | injectable: 10µg /2ml   | X                | X    | X(D) | -   | -   | Sufentanil MYLAN*<br>Sufentanil RENAUDIN*  |
|                                  | injectable: 50 µg/ 10 ml  | X                | X    | X(D) | -   | -   |  |
|                                  | injectable: 250µg/5ml   | X                | X    | X(D) | -   | -   |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                               | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |      |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|--|------------------|------|------|-----|-----|------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD  | HZ   | CSC | CSA |                                    |
| Alfentanil                                | Injectable: solution 1mg/2mL; 5mg/10mL   | X                | X    | X(D) | -   | -   | RAPIFEN                            |
| Remifentanil                              | Injectable : 1mg, 2mg,5mg poudre   | X                | X    | X(D) | -   | -   | Ultiva                             |
| Méthadone chlorhydrate                    | Compime : 5 mg; 10 mg  | X                | X    | -    | -   | -   | Chlorhydrate de<br>METADONE        |
|   | Suspension :5mg/ 5mL; 10mg/ 5mL  | X                | X    | -    | -   | -   |                                    |
| morphine *                                | Granulés: 20mg à 200mg<br>Injectable : 10mg/ml.<br>solution orale : 10mg/5ml<br>immédiate: 10mg<br>Comprimé LP: 10mg à 200 mg<br>(* ) hydromorphe et oxycodone peuvent être utilisés en alternative de la morphine | x(D)             | x(D) | -    | -   | -   | Actiskenan*                        |
| <b>Anti-inflammatoires</b>                |  |                  |      |      |     |     |                                    |
| <b>Antiinflammatoires non steroïdiens</b> |  |                  |      |      |     |     |                                    |
| Acide acétylsalicylique                   | Comprime : 320mg ,500mg ,1g  | X                | X    | X    | X   | X   | Aspirine                           |
|   | Sachet : 100mg,500mg, 1g   | X                | X    | X    | X   | X   |                                    |
|   | Injectable : 500mg, 1g   | X                | X    | X    | X   | X   |                                    |
| Acétylsalicylate de DL-lysine             | Sachet : 100mg;250mg500mg, 1g  | X                | X    | X    | X   | X   | Aspégic                            |
|   | Injectable : 500mg,1g  | X                | X    | X    | X   | X   |                                    |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                            | FORMES ET DOSAGES                              | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)   |
|--|--|------------------|-----|----|------|-----|--|
|  |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |  |
| Ibuprofène                             | comprime : 100mg, 200 mg ,400 mg               | X                | X   | X  | X    | X   | Advil 200,Brufen 400;<br>Advil 400; Spifen; Ibufen                               |
|  | solution buvable 20mg/5ml                      | X                | X   | X  | X    | X   | Spedifen 200   |
| Acide Niflumique                       | gélule: 250mg<br>suppositoire: 400 mg et 700mg | X                | X   | X  | X    | X   | Nifluril   |
| Diclofénac                             | Comprimé :12,5mg, 25mg et 50 mg ,              | X                | X   | X  | X    | X   | Olfen, Diflamex,<br>Diclomax, Difal, Diclowal,<br>Diclac, Dolotren,<br>Voltarène |
|  | Comprimé : 75mg,100mg LP                       | X                | X   | X  | X    | X   |  |
| Acide méfénamique                      | comprime : 250 mg                              | X                | X   | X  | X    | X   | Ponstyl  |
| <b>Anti-inflammatoires stéroïdiens</b> |  |                  |     |    |      |     |  |
| Betaméthasone                          | Injectable :4 mg/ml, 1 ml; goutte (0,05)       | X                | X   | X  | X(U) | -   | Célestène, Diprostène inj  |
|  | Comprimé : 2mg                                 | X                | X   | X  | X(U) | -   |  |
| Prednisolone                           | Comprimé : 20 mg ; 5 mg                        | X                | X   | X  | -    | -   | Solupred,<br>Isolone,Solupred,<br>Cotipred,                                      |
| Dexaméthasone                          | Injectable :4mg/ml                             | X                | X   | X  | X    | X   | Dexaméthasone<br>MYLAN*  |
| Hydrocortisone                         | Injectable : 100 mg                            | X                | X   | X  | X(D) | -   | Hydrocortancyl*  |
| Prednisone                             | 1mg, 5mg,20mg                                  | X                | X   | X  | X(D) | -   | cortancyl  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES                                  | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|--|------------------|-----|----|------|-----|------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |                                    |
| Methylprednisolone                                  | Comp 4mg,16mg,                                     | X                | X   | X  | X(D) | -   | medrol,                            |
|   | injectable, 20mg,40mg,120, 500mg                   | X                | X   | X  | X(D) | -   | solumédrol                         |
| <b>2.3 Autres Médicaments pour soins palliatifs</b> |  |                  |     |    |      |     |                                    |
| Amitriptyline                                       | 10mg; 25 mg comp                                   | x                | x   | x  | -    | -   | Laroxyl                            |
| Docusate de sodium                                  | Capsule : 100mg.                                   | x                | x   | x  | x    | -   | Jamylène, Norgalax                 |
| Fluoxétine *  | 20mg comp<br>(* age> 1 mois.                       | x                | x   | x  | x(U) | -   | prozac                             |
| hyoscine hydrobromide                               | Injectable : 400 micrograms/ml ; 600 micrograms/ml | x                | x   | x  | x    | -   | Scopoderm*                         |
| lactulose   | solution buvable : 3.1 - 3.7 g/5 ml.               | x                | x   | x  | x    | -   | Duphalac, Transilac,<br>Laxose     |
| ondansetron *                                       | Injectable: 2 mg/ml amp de 2 ml<br>(* age> 1 mois. | x                | x   | -  | -    | -   | Zophren*                           |
| Liste complémentaire                                |  |                  |     |    |      |     |                                    |
| <b>3. ANTIALLERGIQUES ET ANTIANAPHYLACTIQUES</b>    |  |                  |     |    |      |     |                                    |
| Prométhazine  | Comprimé: 25 mg                                    | x                | x   | x  | x    | -   | Phénergan,Allergyl                 |
|   | Injectable: 25 mg/ml                               | x                | x   | x  | x    | -   |                                    |
|   | Sirop: 25 mg/5 ml                                  | x                | x   | x  | x    | -   |                                    |
|   | Sirop: 5 mg/5ml                                    | x                | x   | x  | x    | -   |                                    |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES           | Zones Sanitaires |     |    |       |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|-----------------------------|------------------|-----|----|-------|------|---|
|   |                             | CHU              | CHD | HZ | CSC   | CSA  |   |
| Dexchlorpheniramine   | Comprimé: 2 mg              | x                | x   | x  | x     | -    | Polaramine  |
|   | Ampoule: 5mg inj amp de 1ml | x                | x   | x  | x     | -    |   |
|   | Sirop: 0,01% 125 ml         | x                | x   | x  | x(CD) | x(D) |   |
| Desloratadine   | Comprimé: 5mg               | x                | x   | x  | x     | x    | Aerius, Deslor,   |
|   | solution buvable: 0,5mg/ ml | x                | x   | x  | x     | x    |   |
| Lévocétirizine  | comprimé: 5 mg              | x                | x   | x  | x     | x    | Xyzall, Lezyncet, Aristo Hatric   |
| Hydroxyzine   | comprimé: 25 mg             | x                | x   | x  | x(U)  | -    | Hydroxyzine<br>RENAUDIN*  |
|   | Injectable: 100 mg          | x                | x   | x  | x(U)  | -    |   |
|   | 2% sirop                    | x                | x   | x  | x     | x    | Atarax  |
| Mequitazine   | Comprimé :5mg,10mg          | x                | x   | x  | x     | x    | Primalan  |
|   | Sirop : 2,5mL               | x                | x   | x  | x     | x    |   |
| Epinéphrine   | Injectable : 1 mg/ml        | x                | x   | x  | -     | -    | Adrénaline  |
| <b>4. ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISÉES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS</b> |                             |                  |     |    |       |      |   |
| <b>4.1 Généraux</b>   |                             |                  |     |    |       |      |   |
| charbon activé  | poudre en sachet            | x                | x   | x  | x     | -    | Charbon, carbophos,<br>Charbon de Belloc,<br>Arkogélule charbon<br>activé |
| <b>4.2 Spécifiques</b>  |                             |                  |     |    |       |      |   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                 | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                |
|-----------------------------|--|------------------|-----|----|-----|-----|---|
|                             |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| N-Acétylcystéine            | solution inj 5g/25mL   | X                | X   | X  | -   | -   | Fluimucil   |
| Atropine                    | Injectable: 1mg/ml   | x                | x   | x  | x   | -   | Atropine  |
| Flumazénil                  | injectable: 0,5mg/ml   | X                | X   | X  | -   | -   | Anexate*, Flumazénil<br>RENAUDIN*                 |
| Neostygmine                 | injectable: ampoule 1mg/mL   | X                | X   | X  | X   | -   | Prostygmine                                       |
| Gluconate de calcium        | Injectable : 100 mg/ml, ampoule de 10 ml.  | x                | x   | x  | x   | -   | Gluconate calcium<br>Lavoisier*                   |
| Vitamine K1                 | Injectable/buvable: 0,2mL/2mg  | X                | X   | X  | X   | -   | Vitamine K1                                       |
| Dantrolène                  | Injectable : Ampoule 20mg  | X                | X   | X  | -   | -   | Dantrium  |
| Naloxone                    | Injectable: 400 µg/ml ampoule de 1ml   | x                | x   | x  | -   | -   | Narccotan, Naloxone<br>BIOTIS, Naloxone<br>MYLAN* |
| <b>Liste Complémentaire</b> |  |                  |     |    |     |     |   |
| Déféroxamine                | <i>Poudre pour préparation injectable: 500 mg en flacon</i>                                  | x                | x   | x  | -   | -   | Desféral*   |
| Dimercaprol                 | <i>Injection injectable dans un excipient huile : 50 mg/ml dans l'ampoule 2ml.</i>           | x                | x   | x  | -   | -   | B.A.L.*   |
| Domepizole                  | <i>Injection : 5 mg/ml (sulfate) dans l'ampoule 20ml ou 1 g/ml (base)<br/>ampoule 1.5ml.</i> | x                | x   | x  | -   | -   | Fomépipzole AP-HP*                                |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                     | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |       |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                                 |
|---|---|------------------|-----|----|-------|-----|--|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC   | GSA |  |
| <i>Edetate de sodium et de calcium</i>          | <i>Injection : 50 mg/ml dans l'ampoule 1ml.</i>   | x                | x   | x  | -     | -   | CALCIUM EDETATE DE SODIUM SERB*                                    |
| <i>Succimer</i>                                 | <i>Forme galénique orale pleine : magnésium 100.</i>  | x                | -   | -  | -     | -   | Succinaptal*   |
| <b>5. ANTICONVULSIVANTS ET ANTIEPILEPTIQUES</b> |   |                  |     |    |       |     |  |
| acide valproïque<br>(valproate de sodium)       | Comprimé : 200mg, 500mg<br>Granulé : 100 mg, 250mg, 500mg<br>Solution buvable: 200 mg/ ml<br>Sirop : 57,64mg/ml   | x                | x   | x  | x(DU) | -   | Dépakine, valproate de sodium SANDOZ, valproate de sodium AGUETTAN |
| Carbamazépine                                   | Comprimé : 200mg; LP200 mg; LP400mg<br>Suspension buvable: 20 mg/ml.<br>Comprimé sécable : 100mg ; 200mg  | x                | x   | x  | x(U)  | -   | Tégrétol; Carbamazépine Pharmaquick, Carbamazépine TEVA            |
| Diazépam  | Gel ou solution pour voie rectale: 5 mg/ml en tube de 0,5 ml; 2 ml; 4 ml<br>Goutte buvable: 1% flacon 20ml<br>Comprimé : 2mg; 5 mg                              | x                | x   | x  | x(U)  | -   | Valium, Diazepam RENAUDIN*, Diazepam Pharmquick                    |
| Lorazépam                                       | Formulation parentérale: 2 mg/ml en ampoule de 1 ml; 4 mg/ml en ampoule de 1 ml.<br>Comprimé : 0,5 mg; 1mg (prescription réservée aux enfants de plus de 6 ans) | x                | x   | x  | x(U)  | -   | Lorazépam*   |
| Clonazépam                                      | Injectable : 1 mg/ ml<br>Gouttes buvables : 0,25% (1goutte = 0,1mg)   | x                | x   | -  | -     | -   | Rivotril   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)           |
|---|---|------------------|-----|----|------|-----|--|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |  |
| Phénobarbital                                 | Comprimé: 10mg; 50mg et 100 mg<br>Forme buvable: 15 mg/5 ml (phénobarbital).<br>Solution injectable: 40mg; 80mg et 200 mg/ml (phénobarbital sodique). | x                | x   | x  | x(U) | -   | Gardenal*, Aparoxal*                         |
| <b>Liste complémentaire</b>                   |   |                  |     |    |      |     |  |
| Ethosuximide                                  | Capsule: 250 mg.<br>Forme buvable: 250 mg/5 ml.   | x                | x   | x  | x(U) | -   | Zarontin*                                    |
| <b>6. ANTI-INFECTIEUX</b>                     |   |                  |     |    |      |     |  |
| <b>6.1 Antiparasitaires antihelminthiques</b> |   |                  |     |    |      |     |  |
| <b>6.1.1 Anthelminthiques intestinaux</b>     |   |                  |     |    |      |     |  |
| Mébendazole                                   | Suspension buvable 100mg/5ml Comprimé (à croquer): 100 mg; 500 mg.  | x                | x   | x  | x    | x   | Carben, Vermox; Meben                        |
| Albendazole                                   | Suspension buvable 400mg/10ml Comprimé (à croquer): 400 mg.   | x                | x   | x  | x    | x   | Zentel, Alben, Zobéno!, Bendex, Verzol       |
| Flubendazole                                  | suspension buvable 2%<br>comprimé 100mg   | x                | x   | x  | x(D) | -   | Fluvermal                                    |
| Pyrantel                                      | Forme buvable: 50 mg /ml, 125m/2,5mL; comp 125mg, 250mg   | x                | x   | x  | x    | x   | Combantrin, Helmintox, Combifrinil, Pyrantox |
| <b>6.1.2 Antifilariens</b>                    |   |                  |     |    |      |     |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)        |
|---|--|------------------|-----|----|------|-----|---|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |   |
| Albendazole   | suspension buvable 400mg/10ml Comprimé (à croquer): 400 mg.  | x                | x   | x  | x    | x   | Zentel, Alben, ZobénoI,<br>Bendex, Verzol |
| Ivermectine   | Comprimé (sécable): 3 mg   | x                | x   | x  | x    | x   | Mectizan*, Almactin                       |
| <b>6.1.3 Schistosomicides (antibilharziens) et antitrématodes</b> |  |                  |     |    |      |     |   |
| Praziquantel  | Comprimé: 600 mg.  | x                | x   | x  | x    | x   | Biltricide                                |
| <b>Liste complémentaire</b>                                       |  |                  |     |    |      |     |   |
| Oxamniquine*  | Capsule: 250 mg.<br>Forme buvable: 250 mg/5 ml.<br>* L'oxamniquine figure dans la liste en cas d'échec thérapeutique avec le praziquantel.                                   | x                | -   | -  | -    | -   | oxamniquine*                              |
| <b>6.2 Antibactériens</b>   |  |                  |     |    |      |     |   |
| <b>6.2.1 Bêta-lactamines</b>                                      |  |                  |     |    |      |     |   |
| Amoxicilline <sup>A</sup>   | Forme solide pour voie orale: 250 mg; 500 mg<br>Comprimé dispersible 125mg; 250mg; 500mg<br>Poudre pour forme buvable: 125 mg /5 ml; 250 mg/5 ml.                            | x                | x   | x  | x    | x   | Clamoxyl , Hiconcil,<br>Bactox            |
| Amoxicilline + acide clavulanique <sup>A</sup>                    | Comprimé: 500 mg + 125 mg<br>Forme buvable: 125 mg amoxicilline + 31,25 mg acide clavulanique/5 ml ET 250 mg amoxicilline + 62,5 mg acide clavulanique/5 ml<br>inj 500/50mg. | x                | x   | x  | x(D) | -   | Augmentin, curam,<br>Zamox, Fleming,      |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                             |
|--|---|------------------|-----|----|------|------|--|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA  |  |
| Ampicilline <sup>A</sup>                     | Poudre pour préparation injectable: 500 mg; 1 g en flacon.  | x                | x   | x  | x    | x    | Totapen, Rosampline*   |
| Benzathine benzylpénicilline <sup>A</sup>    | Poudre pour préparation injectable: 900 mg benzylpénicilline (= 1,2 millions UI) en flacon de 5 ml; 1,44 g benzylpénicilline (= 2,4 millions UI) en flacon de 5 ml. | x                | x   | x  | x(D) | x(D) | Extencilline, Dicacilline, Benzathine-benzylpénicilline UBIGEN |
| Benzylpénicilline <sup>A</sup>               | Poudre pour préparation injectable: 600 mg (= 1 million UI); 3 g (= 5 millions UI) en flacon.   | x                | x   | x  | x    | x    | Pénicilline G  |
| Phénoxyéthylpénicilline (PéniV) <sup>A</sup> | Comprimé: 250 mg (sous forme de sel de potassium).<br>Poudre pour forme buvable: 250 mg/5 ml.   | x                | x   | x  | x    | -    | Ospen, Oracilline, Starpen                                     |
| Procaïne-benzylpénicilline <sup>A</sup>      | Poudre pour préparation injectable: 1 g (= 1 million UI); 3 g (= 3 millions UI) en flacon.  | x                | x   | x  | x    | -    | Retarpen, Pénicilline retard                                   |
| Cloxacilline <sup>A</sup>                    | Capsule: 500 mg; 1 g (sous forme de sel de sodium).<br>Poudre pour forme buvable: 125 mg/5 ml.<br>Poudre pour préparation injectable: 500 mg en flacon. g           | x                | x   | x  | x    | x    | Cloxa  |
| Flucloxacilline <sup>A</sup>                 | Suspension buvable 125mg/5ml; 250mg/5ml   | x                | x   | x  | x    | -    | Fuclo Astaph   |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION               | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)       |
|---------------------------|--|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|                           |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| Oxacilline <sup>A</sup>   | Injectable: 1g   | x                | x   | x  | x   | -   | Bristopen                                |
| Céfadroxy <sup>A</sup>    | Poudre pour suspension buvable: 125mg/5ml; 250mg/5ml<br>500mg/5ml                                | x                | x   | x  | x   | -   | Oracéfal                                 |
| Céfalexine <sup>A</sup>   | Poudre pour suspension buvable: 125 mg/5 ml; 250 mg/5ml;<br>Forme solide pour voie orale: 250 mg | x                | x   | x  | x   | -   | Kéforal                                  |
| Céfuroxime <sup>A</sup>   | Suspension buvable: 125mg/mg<br>Comprimé: 250mg ; 500mg<br>Injectable: 750mg                     | x                | x   | x  | -   | -   | Zinnat                                   |
| Ceftriaxone <sup>WA</sup> | Poudre pour préparation injectable: 250 mg; 1 g en flacon.                                       | x                | x   | x  | -   | -   | ROCEPHINE, Lomecef,<br>Accuzon, Mesporin |
| Céfotaxime <sup>WA</sup>  | <i>Poudre pour préparation injectable: 250 mg par flacon</i>                                     | x                | x   | -  | -   | -   | Claforan, Kefotax,<br>Cefotaxime MYLAN   |
| Ceftazidime <sup>WA</sup> | <i>Poudre pour préparation injectable: 250 mg ou 1000 mg en flacon.</i>                          | x                | x   | -  | -   | -   | Fortum, Cetazime,<br>Betazidim           |
| Cefixime <sup>WA</sup>    | Suspension buvable 100mg/5ml<br>Comprimé 200mg   | x                | x   | x  | -   | -   | OROKEN                                   |
| Cefpodoxime <sup>WA</sup> | Suspension buvable 100mg   | x                | x   | x  | -   | -   | Orelox                                   |
| Méropénèm <sup>WA</sup>   | Inj 500mg 1g   | x                | x   | -  | -   | -   | Ménem Méronia                            |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                             | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)               |
|---|---|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| Imipénème* + cilastatine* <sup>WA</sup> | Poudre pour préparation injectable: 250 mg + 250 mg;<br>500 mg + 500 mg en flacon.<br>* NB: imipénème est sous forme monohydraté et la cilastatin sous forme de sel de sodium,  | x                | -   | -  | -   | -   | Bacqur, Tienam*                                  |
| <b>6.2.2 Aminosides</b>                 |   |                  |     |    |     |     |  |
| Gentamicine <sup>A</sup>                | Solution injectable: 10 mg; 40 mg (sous forme de sulfate)/ml en flacon de 2 ml.   | x                | x   | x  | -   | -   | Gentalline; Philco Genta                         |
| Netilmicine <sup>A</sup>                | Injectable: 25mg et 50 mg   | x                | x   | x  | -   | -   | Nétromycine                                      |
| Amikacine <sup>A</sup>                  | Injectable: 50mg  | x                | x   | x  | -   | -   | Amiklin  |
| <b>6.2.4 Macrolides</b>                 |   |                  |     |    |     |     |  |
| Erythromycine <sup>WA</sup>             | Poudre pour forme buvable: 250 mg (sous forme de stéarate ou d'estolate ou d'éthylsuccinate).<br>Poudre pour forme buvable: 125 mg/5 ml (sous forme de stéarate ou d'estolate ou d'éthylsuccinate).<br>Comprimé 250mg 500mg | x                | x   | x  | x   | x   | Ery, Abboticine, Cary                            |
| Azithromycine* <sup>WA</sup>            | Capsule: 250 mg; 500 mg (anhydre).<br>Forme buvable: 200 mg/5 ml.<br>* Ne figure dans la liste que pour le traitement du trachome.  | x                | x   | x  | -   | -   | Zithromax, Azee, Azithro, Azix Azitrhin, Azicure |
| Lincomycine <sup>WA</sup>               | Suspension buvable 250mg 500mg<br>Injectable: 500mg et 1g   | x                | x   | x  | -   | -   | Lincocine  |
| Clindamycine <sup>WA</sup>              | Capsule: 150 mg (sous forme de chlorhydrate).<br>Forme buvable: 75 mg/5 ml (sous forme de palmitate).<br>Solution injectable: 150 mg (sous forme de phosphate)/ml.  | x                | x   | x  | -   | -   | Dalacine   |
| <b>6.2.5 Phénicolés</b>                 |   |                  |     |    |     |     |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION                                   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                  |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|---|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| Chloramphénicol <sup>A</sup>                  | Capsule 250mg<br>Inj 500mg 1g<br>suspension buvable 150/5ml  | x                | x   | x  | -   | -   | Chloramphénicol                                     |
| Thiamphénicol <sup>A</sup>                    | Capsule 250mg<br>Injectable: 500mg et 1g<br>suspension buvable 150/5ml   | x                | x   | x  | -   | -   | Thiobactin  |
| <b>6.2.6 Cyclines</b>                         |  |                  |     |    |     |     |   |
| Doxycycline <sup>A</sup>                      | Comp: 100 mg (sous forme d'hydrate).   | x                | x   | x  | x   | x   | Doxycycline   |
| <b>6.2.7 Quinolones</b>                       |  |                  |     |    |     |     |   |
| Ciprofloxacine <sup>WA</sup>                  | Comprimé: 250 mg (sous forme de chlorhydrate).<br>Forme buvable: 250 mg/5 ml (anhydre).<br>Solution pour perfusion IV: 2 mg/ml (sous forme d'hydrate). | x                | x   | x  | x   | x   | Ciplox, Spectrum                                    |
| <b>6.2.8 Autres antibactériens</b>            |  |                  |     |    |     |     |   |
| Métronidazole <sup>A</sup>                    | Comprimé: 250mg et 500 mg.<br>Forme buvable: 4%.<br>Solution injectable pour perf. : 500 mg en flacon de 100 ml.                                       | x                | x   | x  | x   | x   | Flagyl, Tronid, Supplin;<br>Amibazol;Ovazol; Flazol |
| sulfaméthoxazole + triméthoprime <sup>A</sup> | Comprimé: 400 mg + 80 mg.<br>Forme buvable: 200 mg + 40 mg/5 ml.   | x                | x   | x  | x   | x   | Bactrim, Eusaprim,<br>Ulcaprim, Berlocid            |
| vancomycine <sup>WA</sup>                     | Poudre pour préparation injectable: 250 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon.   | x                | x   | -  | -   | -   | Vancomycine   |
| Fosfomycine <sup>RE</sup>                     | granulés en sachet 3g  | x                | x   | -  | -   | -   | Monuril   |
|   | Poudre pour injection: 2g et 4 g   | x                | x   | -  | -   | -   | fosfomycine   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)            |
|---|--|------------------|-----|------|-----|-----|---|
|   |  | CHU              | CHD | HZ   | CSC | CSA |   |
| <b>6.2.3 Antilépreux</b>                      |  |                  |     |      |     |     |   |
| Clofazimine                                   | Gélule : 50 mg   | x                | x   | x(L) | x   | x   | MDT-PB adulte<br>NOVARTIS*                    |
| Dapsone                                       | Comprimé: 50 mg  | x                | x   | x(L) | x   | x   |   |
|   | Gélule: 150 mg; 300 mg.  | x                | x   | x(L) | x   | x   |   |
| <b>6.2.4 Antituberculeux</b>                  |  |                  |     |      |     |     |   |
| Ethambutol (E)                                | comprimés dispersibles: 100 mg   | x                | x   | x(L) | x   | x   | Ethambutol IDA,<br>Dexambutol*,<br>Myambutol* |
| Isoniazide (H)                                | comprimés dispersibles: 100 mg   | x                | x   | x(L) | x   | x   | Rimifon*, Rifinah*                            |
| Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide (RHZ) | comprimés dispersibles: 75+50+150 mg   | x                | x   | x(L) | x   | x   | Rifater*                                      |
| Rifampicine + Isoniazide (RH)                 | comprimés dispersibles: 75+50 mg   | x                | x   | x(L) | x   | x   | Rifinah*                                      |
| <b>6.3 Antifongiques</b>                      |  |                  |     |      |     |     |   |
| Amphotéricine B                               | <i>Poudre pour préparation injectable: 50 mg en flacon.<br/>Poudre pour suspension buvable 250 mg flacon de 40ml et de 80 ml sous<br/>forme de désoxycholate de sodium ou de complexe liposimique.</i> | x                | x   | x    | x   | x   | Fungizone                                     |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)   |
|--|--|------------------|-----|----|------|-----|--|
|  |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |  |
| Fluconazole  | Capsule: 50 mg.<br>Forme buvable: 50 mg/5 ml.<br>Solution injectable: 2 mg/ml en flacon.   | x                | x   | x  | x    | x   | Flucazole, Forcan,<br>Fluomac  |
| Miconazole   | <i>gel buccal : 2%</i>   | x                | x   | x  | x    | x   | <i>daktarin gel buccal</i>   |
| Griséofulvine  | Forme buvable: 125 mg/5 ml.<br>Forme solide pour voie orale: 125 mg; 250 mg.   | x                | x   | x  | x    | -   | Griséfuline, Fulcine,<br>Griséo Griséofulvine<br>PPM, Griséofulvine<br>CREAT |
| Nystatine  | Comprimé: 100 000 UI; 500 000 UI.<br>Forme buvable: 50 mg/5 ml; 100 000 UI/ml.<br>Pastille: 100 000 UI.                                    | x                | x   | x  | x(U) | -   | Mycostatine  |
| <b>Liste complémentaire</b>  |  |                  |     |    |      |     |  |
| Iodure de potassium  | <i>Solution saturée.</i>   | x                | x   | x  | -    | -   | iodure de potassium*   |
| <b>6.4 Antiviraux</b>  |  |                  |     |    |      |     |  |
| <b>6.4.1 Antiherpétiques</b>   |  |                  |     |    |      |     |  |
| Aciclovir  | Comprimé: 200 mg.<br>Forme buvable: 200 mg/5 ml.<br>Poudre pour préparation injectable: 250 mg (sous forme de sel de sodium)<br>en flacon. | x                | x   | x  | x    | x   | Zovirax, Alvir   |
| <b>6.4.2 Antirétroviraux</b>   |  |                  |     |    |      |     |  |
| <b>6.4.2.1 Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse</b> |  |                  |     |    |      |     |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| Abacavir (ABC)  | Comprimé dispersible : 60 mg<br>Forme buvable: 100 mg (sous forme de sulfate)/5 ml. Flacon de 240 ml  | x                | x   | x  | x   | x   | Ziagen                             |
| Lamivudine (3TC)  | Forme buvable: 50 mg/5 ml. flacon de 240 ml   | x                | x   | x  | x   | x   | Zéffix                             |
| Zidovudine (ZDV ou AZT)   | Solution buvable: 50 mg/5 ml. Flacon de 240 ml et de 100ml<br>Comprimé: 60 mg.  | x                | x   | x  | x   | x   | aviro-z, retrovir                  |
| <b>6.4.2.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Efavirenz (EFV ou EFZ) <u>a</u>   | Comprimé dispersible et séccable: 200 mg.<br><u>a</u> > 3 ans ou poids > 10 kg.   | x                | x   | x  | x   | x   | Stocrin                            |
| Névirapine (NVP)  | Forme buvable: 50 mg/5 ml. Flacon de 240 ml et de 100ml<br>Comprimé dispersible: 50 mg  | x                | x   | x  | x   | x   | Nevepan, Viramune,<br>Névirapine   |
| <b>6.4.2.3 Inhibiteurs de protéase</b>                                    |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Atazanavir <u>a</u>   | Forme solide pour voie orale: 100 mg; 150 mg; 300 mg.<br><u>a</u> Poids > 25 kg.  | x                | x   | x  | x   | x   | Reyataz*                           |
| Lopinavir + ritonavir (LPV/r)   | Granulé : 40/10mg par sachet<br>Comprimé (thermostable): 100 mg + 25 mg; Forme buvable: (Thermosensibile): 80/20 mg/ml, flacon de 5x60ml (300 ml) | x                | x   | x  | x   | x   | Aluvia; Kélatra                    |
| Darunavir/r <u>a</u> (DRV)  | 600mg comp<br><u>a</u> > à 6ans   | x                | x   | x  | -   | -   | Prezista*                          |
| Ritonavir   | Comprimé (thermostable): 100 mg.<br>Forme solide pour voie orale: 100 mg.   | x                | x   | x  | x   | x   | Norvir                             |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| <b>6.4.2.4 Inhibiteurs de l'intégrase</b>                   |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Raltégravir <u>a</u> (RAL)                                  | 400 mg comp<br><u>a</u> > à 6ans  | x                | x   | x  | -   | -   | Insentress                         |
| <b>ASSOCIATIONS FIXES ou COMBINAISONS A DOSE FIXE (CDF)</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Abacavir/lamivudine (ABC/3TC)                               | Comprimé dispresible: 60mg/30 mg<br>Comprimé dispresible et sécable :120mg/60 mg  | x                | x   | x  | x   | x   |                                    |
| Lamivudine/zidovudine                                       | Comprimé: 30 mg/60 mg;  | x                | x   | x  | x   | x   | Combivir; Duovir                   |
| Ténofovir/lamivudine  | Comprimé dispersible: 75mg/75mg   | x                | x   | x  | x   | x   |                                    |
| Ténofovir/Emtricitabine <u>a</u>                            | 300mg/200mg<br><u>a</u> > à 6ans  | x                | x   | x  | x   | x   | Truvada                            |
| lamivudine/névirapine/zidovudine                            | Comprimé: 30 mg/50 mg/60 mg;  | x                | x   | x  | x   | x   | Duovir-N                           |
| <b>6.4.3 Autres Antiviraux</b>                              |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Oseltamivir*  | Capsule: 30 mg; 45 mg; 75 mg (sous forme de phosphate).<br>Poudre pour voie orale: 12 mg/ml.<br>L'oseltamivir devrait être utilisé uniquement conformément aux recommandations thérapeutiques de l'OMS. | x                | x   | -  | -   | -   | Tamiflu                            |
| Ribavirine*   | Injectable : ampoule 100 mg<br>* Uniquement pour le traitement des fièvres hémorragiques virales.   | x                | x   | x  | -   | -   | Copegus*; Rebétol*                 |
| Aciclovir   | 200 mg comp   | x                | x   | x  | x   | x   | Zovirax                            |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---|------------------|-----|----|------|-----|------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |                                    |
| Interferon alfa-2a                                      | solution injectable: 135 µg   | x                | -   | -  | -    | -   | Pegasys*                           |
| Interferon alfa-2b                                      | poudre/solvant pour solution injectable : 100µg   | x                | -   | -  | -    | -   | Viraferonpeg*                      |
| <b>6.5 Antiparasitaires antiprotozoaires</b>            |   |                  |     |    |      |     |                                    |
| <b>6.5.1 Antiamibiens et antitrichomonas</b>            |   |                  |     |    |      |     |                                    |
| Tinidazole  | Comprimé: 50mg  | x                | x   | x  | x    | x   | Fasigyne                           |
| Secnidazole   | Comprimé: 50mg  | x                | x   | x  | x    | x   | flagentyl                          |
| Métronidazole <sup>A</sup>                              | Comprimé: 200 mg à 500 mg.<br>Forme buvable: 200 mg (sous forme de benzoate)/5 ml.<br>Solution injectable: 500 mg en flacon de 100 ml.    | x                | x   | x  | x    | x   | Flagyl                             |
| <b>6.5.2 Antileishmaniens</b>                           |   |                  |     |    |      |     |                                    |
| stibogluconate de sodium ou<br>antimoniote de méglumine | Solution injectable: 100 mg/ml, 1 flacon = 30 ml ou 30%,<br>correspondant à environ 8,1% d'antimoine (pentavalent) en ampoule de 5<br>ml. | x                | x   | x  | x(D) | -   | Glucantime*                        |
| <b>6.5.3 Antipaludiques</b>                             |   |                  |     |    |      |     |                                    |
| <b>6.5.3.1 Traitement curatif</b>                       |   |                  |     |    |      |     |                                    |
| Artémether*   | Solution injectable huileuse: 80 mg/ml en ampoule de 1 ml.  | x                | x   | x  | x    | x   | Artésiane, Malather,<br>Gvither    |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                             |
|--|--|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|  |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| Dihydroartémisinine +piperaquine   | Comprimé: 40/320mg   | x                | x   | x  | x   | x   | malacur  |
| Artésunate   | injectable 30mg ,60mg, 120mg   | x                | x   | x  |     |     | malacef ,artesun   |
|  | Forme rectale: capsules de 50 mg; 200 mg   |                  |     |    | x   | x   | Plasmotrim   |
| Artéméther + luméfantrine*   | Comprimé: 20 mg + 120 mg B/6<br>Comprimé : (dispersible): 20 mg + 120 mg B/6<br>Comprimé: 80/480mg blist de 6 comp   | x                | x   | x  | x   | x   | Coartem, Cofantrine,<br>Artefan, lumart,<br>lumartem, Lufanter |
| Quinine  | Comprimé: 300 mg (sulfate de quinine) ou 300 mg (bisulfate de quinine);<br>100 mg (sulfate de quinine),<br>Solution injectable: 300 mg/2ml et 300mg/1ml sous forme de<br>quinine chlorhydrate. | x                | x   | x  | x   | -   | Quinimax;<br>Arsiquinoforme,<br>Surquina                       |
| <b>6.5.3.1 Traitement préventif</b>  |  |                  |     |    |     |     |  |
| Sulfadoxine Pyriméthamine + Amodiaquine (*)                                  | Comprimé: 250-12,5mg/75mg<br>Comprimé: 500-25/150mg<br>(*) uniquement en campagne pour la chimioprophylaxie saisonnière contre le<br>paludisme   | -                | -   | -  | -   | x   |  |
| <b>6.5.4 Médicaments utilisés contre la pneumocystose et la toxoplasmose</b> |  |                  |     |    |     |     |  |
| Pyriméthamine  | Comprimé: 25 mg.   | x                | x   | x  | x   |     | Malocide*  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| Sulfadiazine   | Comprimé: 500 mg.   | x                | x   | x  | x   |     | Adiazine*                          |
| Sulfaméthoxazole + triméthoprime   | Comprimé: 400 mg + 80 mg.<br>Forme buvable: 200 mg + 40 mg/5 ml.  | x                | x   | x  | x   | x   | Bactrim                            |
| Spiramycine  | Comprimé: 0,75MUI, 1,5MUI et 3 MUI  | x                | x   | x  | x   | x   | Rovamycine                         |
| <b>6.5.5 Trypanosomicide</b>   |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>6.5.5.1 Médicament contre la <i>Trypanosomiase africaine</i></b>                    |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>Médicaments pour le traitement du premier stade de la trypanosomiase africaine</b>  |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Pentamidine*   | Poudre pour préparation injectable: 200 mg (isétionate de pentamidine) en flacon.<br>* A utiliser pour le traitement de l'infection à <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .       | x                | x   | x  | -   | -   | Pentacarinat*                      |
| Suramine sodique*  | Poudre pour préparation injectable: 1 g en flacon.<br>* A utiliser exclusivement pour le traitement de la phase initiale de l'infection à <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i> . | x                | -   | -  | -   | -   | suramine sodique*                  |
| <b>Médicaments pour le traitement du deuxième stade de la trypanosomiase africaine</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Eflornithine*  | Solution injectable: 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml.<br>* A utiliser pour le traitement de l'infection à <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .                      | x                | x   | x  | x   | -   | Ornidyl*                           |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                    | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                   |
|--|---|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| <i>Liste complémentaire</i>                    |   |                  |     |    |     |     |  |
| Méarsoprol                                     | <i>Solution injectable; solution à 3,6%, en ampoule de 5 ml (180 mg de principe actif).</i> | x                | x   | x  |     |     | méarsoprol *   |
| <b>7. ANTIMIGRAINEUX</b>                       |   |                  |     |    |     |     |  |
| <b>7.1 Médicaments de la crise</b>             |   |                  |     |    |     |     |  |
| Ibuprofène                                     | Comprimé: 200 mg; 400 mg.   | x                | x   | x  | x   | x   | Brufen 400; Advil 400;<br>Spifen; Ibufen<br>Spedifen |
| Paracétamol                                    | Comprimé: 300 mg à 500 mg.<br>Forme buvable: 125 mg/5 ml.                                   | x                | x   | x  | x   | x   | Doliprane, efferalgan                                |
| Sumatriptan                                    | solution pulverisation nasale :10mg   | X                | X   | X  | X   | -   | Imigrane   |
| Paracetaamol + codéine                         | comprime : 500mg + 30 mg  | X                | X   | X  | X   | -   | propofan , Klipal,<br>claradol codéine               |
| Paracetaamol + caféine                         | comprimé : 500mg + 65 mg  | X                | X   | X  | X   | -   | Panadol Extra  |
| AAS+ codeine + caféine                         | comprimé: 500mg + 20mg + 50mg   | X                | X   | X  | X   | -   | SEDASPIR   |
| <b>7.2 Médicaments utilisés en prophylaxie</b> |   |                  |     |    |     |     |  |
| propranolol                                    | Comprimé: 20 mg; 40 mg (chlorhydrate).  | X                | X   | X  | -   | -   | Avlocardyl   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                 | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| <b>8. CYTOTOXIQUES ET IMMUNOSUPPESSEURS</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>8.1 Antinéoplasiques</b>                 |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Docétaxel                                   | 20mg inj et 80 mg inj   | x                | x   | -  | -   | -   | Taxotère                           |
| Vinorelbine                                 | 10 mg/ ml inj et 50 mg /5ml inj   | x                | x   | -  | -   | -   | Navelbine                          |
| Chlorambucil                                | Gélule : 2mg  | x                | x   | -  | -   | -   | Chloraminophène*                   |
| Cytarabine                                  | 100mg; 500 mg poudre inj ; 1g poudre inj et 2 g poudre inj  | x                | x   | -  | -   | -   | Aracytine                          |
| Oxaliplatine                                | Injectable : 50mg/10ml FI 10ml; 100mg/20ml FI 20ml; 200mg/40ml FI 40ml<br>Poudre pour injection : 50mg; 100mg | x                | x   | -  | -   | -   | Oxaliplatine KABI*                 |
| Carboplatine                                | Injectable : 50mg/5ml ; 150mg/15ml; 450mg/45ml ; 600mg/60ml   | x                | x   | -  | -   | -   | Carboplatine KABI*                 |
| Paclitaxel                                  | Poudre pour injection : 6mg/ml; 100mg/17ml  | x                | x   | -  | -   | -   | Taxol* Paxene*                     |
| Etoposide                                   | Gélule : 100 mg<br>Injectable : 100 mg/5ml  | x                | x   | -  | -   | -   | Celltop* Etopophos*                |
| Procarbazine                                | 50 mg gelule  | x                | x   | -  | -   | -   | Caryolysine, Natulan*              |
| Fludarabine                                 | 10 mg comp pelliculé; 50 mg/10 ml inj   | x                | x   | -  | -   | -   | Fludara*                           |
| Doxorubicine                                | 10mg / 5 ml inj; 50 mg /25 ml inj   | x                | x   | -  | -   | -   | Adriblastine                       |
| Cisplatine                                  | 10 mg / 10 ml inj; 25 mg / 25 ml inj et 50 mg/50 ml inj   | x                | x   | -  | -   | -   | Cisplatyl*                         |
| Vincristine                                 | 1mg/ml inj  | x                | x   | -  | -   | -   | Vincristine, Oncovin*              |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                    | FORMES ET DOSAGES            | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                      |
|--|------------------------------|------------------|-----|----|-----|-----|---|
|  |                              | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| Bléomycine                                     | 15mg inj                     | x                | x   | -  | -   | -   | Bléomycine*,<br>Bléomycine TEVA*,<br>Bléomycine BELLON* |
| Acide ibandronique                             | 2 mg inj et 6 mg inj         | x                | x   | -  | -   | -   | Bondronate  |
| 5 Fluoro-uracile                               | 250 mg inj et 500 mg inj     | x                | x   | -  | -   | -   | Fluorouracile*  |
| Epirubicine                                    | 50mg                         | x                | x   | -  | -   | -   | Farmorubicine   |
| acide zolédronique                             | 4mg /100ml inj               | x                | x   | -  | -   | -   | Zometra*, Zolnic*                                       |
| Melfalan                                       | 2 mg comp                    | x                | -   | -  | -   | -   | Alkeran*  |
| Mercaptopurine                                 | 50 mg comp                   | x                | -   | -  | -   | -   | Purinethol*   |
| Asparaginase                                   | 10.000 UI pdre/sol p sol inj | x                | -   | -  | -   | -   | Kidrolase*  |
| <b>8.2 immunosuppresseurs</b>                  |                              |                  |     |    |     |     |   |
| Cyclophosphamide                               | 1 g inj et 500 mg inj        | x                | x   | -  | -   | -   | Andoxan   |
| Méthotrexate                                   | 25mg inj et 50 mg inj        | x                | x   | -  | -   | -   | Méthotrexate*, Novatrex*                                |
|  |                              |                  |     |    |     |     |   |
| <b>09. MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE</b> |                              |                  |     |    |     |     |   |
| <b>9.1 Antianémiques</b>                       |                              |                  |     |    |     |     |   |
| Acide folique                                  | Comprimé: 1 mg; 5 mg.        | x                | x   | x  | x   | x   | Spéciafoldine*, Acfol,<br>Rekafol                       |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION                               | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                 |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| Hydroxocobalamine                         | Solution injectable: 1 mg (sous forme d'acétate, de chlorhydrate ou de sulfate) en ampoule de 1 ml.                | x                | x   | x  | -   | -   | Dodecavit*   |
| Sels ferreux                              | Comprimé: correspondant à 60 mg de fer.<br>Forme buvable: correspondant à 25 mg de fer (sous forme de sulfate)/ml. | x                | x   | x  | x   | x   | Tardyferon 80, Fumafer, Ferrostrane sirop, Hémafer |
| <b>9.2 Anticoagulants et antagonistes</b> |  |                  |     |    |     |     |  |
| <b>9.2.1 Anticoagulants</b>               |  |                  |     |    |     |     |  |
| Héparine sodique                          | Solution injectable: 5000 UI/ml ; 25000 UI/5ml en ampoule de 1 ml.   | x                | x   | x  | -   | -   | Calciparine*                                       |
| Enoxaparine sodique                       | Solution injectable: 1000UI/ml ; 2000UI/ml   | x                | x   | x  | -   | -   | Lovenox  |
| Warfarine                                 | Comprimé: 2 mg; 5 mg (sel de sodium).  | x                | x   | x  | -   | -   | Coumadine*   |
| Fluindione                                | comprimé quadrisécable : 20mg  | x                | x   | x  | -   | -   | Previscan  |
| <b>9.2.2 Hémostatiques</b>                |  |                  |     |    |     |     |  |
| Sulfate de protamine                      | Solution injectable: 10 mg/ml en ampoule de 5 ml.  | x                | x   | x  | -   | -   | PROTAMINE CHOAY*                                   |
| Phytoménadione                            | Solution injectable et buvable : 10 mg/ml en ampoule de 5 ml; 2mg/0,2ml.   | x                | x   | x  | x   | x   | Vitamine K1 Roche                                  |
| Acide tranexamique                        | Comprimé : 500 mg  | x                | x   | x  | x   | x   | Exacyl, Spotof*                                    |
|   | Ampoule buvable : 1g/10 ml   | x                | x   | x  | x   | x   |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |       |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|---|------------------|-----|----|-------|------|------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC   | CSA  |                                    |
|   | Injectable : 0,5g/5ml   | x                | x   | x  | x     | x    |                                    |
| <b>9.3 Autres médicaments pour le traitement des hémoglobinopathies</b>     |   |                  |     |    |       |      |                                    |
| Déféroxamine*   | <i>Poudre pour préparation injectable: 500 mg (mésylate) en ampoule.<br/>* Le déférasirox sous forme orale peut être une alternative selon la disponibilité et le coût.</i> | x                | x   | x  | -     | -    | Desféral*                          |
| Hydroxycarbamide  | <i>Forme solide pour voie orale: 200 mg; 500 mg; 1 g.</i>   | x                | x   | x  | -     | -    | Hydrea; Siklos*                    |
| <b>9.4 Produits sanguins et substituts du plasma (Succédanés du plasma)</b> |   |                  |     |    |       |      |                                    |
| Hydroxyéthylamidon  | Solution en poche PVC de 500ml  | x                | x   | x  | -     | -    | Lomol*; Elohes*                    |
| Dextran 70  | Sol. à 6%, inj  | x                | x   | x  | x (D) | x(D) | Hémodex*, Réomacrodex*             |
| Gélatine fluide modifiée isotonique   | 30 g/l - flacon 500 ml inj  | x                | x   | x  | -     | -    | Haemacel, Plasmion*                |
| <b>10. MEDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGEIOLOGIE</b>                       |   |                  |     |    |       |      |                                    |
| <b>10.1 Antihypertenseurs</b>   |   |                  |     |    |       |      |                                    |
| Enalapril   | Comprimé: 2,5 mg; 5 mg<br>(sous forme de maléate d'hydrogène).  | x                | x   | x  | -     | -    | Rénitec                            |
| <b>10.2 Anti-arythmiques</b>  |   |                  |     |    |       |      |                                    |
| Propranolol   | Comprimé : 40 mg  | x                | x   | x  | x(D)  | -    | Propranolol                        |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|--|--|------------------|-----|----|------|-----|---|
|  |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |   |
| Bisoprolol   | Comprimé : 2,5mg; 5mg  | x                | x   | x  | x(D) | -   | Bibloc, Bisoprolol  |
| Amiodarone   | Comprimé : 200mg<br>Injectable : 150mg/ml  | x                | x   | x  | -    | -   | Cordarone, Amiodarone<br>SANDOZ*, Amiodarone<br>TEVA*                                 |
| <b>10.3 Tonicardiaques</b>                                 |  |                  |     |    |      |     |   |
| Dopamine   | <i>solution injectable: 40 mg (chlorhydrate) en flacon de 5 ml.</i>  | x                | x   | -  | -    | -   | Dopamine, Dopamine-<br>Biotis, Dopamine<br>MYLAN*, Dopamine<br>AGUETTANT*             |
| Epinéphrine/Adrénaline                                     | Solution injectable: 1 mg/ml   | x                | x   | x  | -    | -   | Anahelp*,<br>Alapen*/Adrénaline,<br>Adrénaline<br>AGUETTANT*,<br>Adrénaline RENAUDIN* |
| Dobutamine   | Solution injectable: 250 mg  | x                | x   | -  | -    | -   | Dobutrex*   |
| Digoxine   | Comprimé: 0,25 mg; 0,125mg<br>Forme buvable: 0,050 mg/0,1ml.<br>Solution injectable: 0,5mg en ampoule de 2 ml. | x                | x   | -  | -    | -   | Digoxine Nativelle*,<br>Dogoxine SANDOZ*,<br>Hemigoxine Nativelle*                    |
| <b>10.4 Prostaglandines</b>                                |  |                  |     |    |      |     |   |
| Alprostadi (Prostaglandine E1)                             | ampoule injectable : 0,5mg/ml  | x                | -   | -  | -    | -   | Prostine VR*  |
| -  |  |                  |     |    |      |     |   |
| <b>11. MEDICAMENTS UTILISES EN DERMATOLOGIE (topiques)</b> |  |                  |     |    |      |     |   |
| <b>11.1 Antifongiques</b>                                  |  |                  |     |    |      |     |   |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)    |
|---|--|------------------|-----|----|------|------|---------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA  |                                       |
| Miconazole  | Crème ou pommade: 2% (nitrate).                                | x                | x   | x  | x    | x(D) | daktarin                              |
| Acide benzoïque + acide salicylique   | pommade à (6% + 3%)  | x                | x   | x  | x(D) | -    |                                       |
| Terbinafine   | Crème: 1% OU Pommade: 1% de chlorhydrate de terbinafine.       | x                | x   | x  | x    | x(D) | lamisil                               |
| Ketoconazole  | Gel moussant<br>Crème 2%                                       | x                | x   | x  | x    | x(D) | Ketoderm, Micozal                     |
| <b>11.2 Anti-infectieux</b>   |  |                  |     |    |      |      |                                       |
| Mupirocine  | Crème (sous forme de mupirocine calcique): 2%.<br>Pommade: 2%. | x                | x   | x  | x    | x(D) | Bactroban, Monsin                     |
| Permanganate de potassium   | Solution aqueuse: 1:10 000.                                    | x                | x   | x  | x    | x(D) | permanganate de potassium PHARMAQUICK |
| Sulfadiazine argentique   | Crème: 1%.   | x                | x   | x  | x    | x(D) | Silverderma, Silverex,<br>FLAMMAZINE  |
| <b>11.3 Anti-inflammatoires et antiprurigineux</b>                            |  |                  |     |    |      |      |                                       |
| Betaméthasone   | Crème ou pommade: 0,1% (sous forme de valérate)                | x                | x   | x  | x    | x(D) | Betneval                              |
| Calamine  | Lotion   | x                | x   | x  | x    | x(D) | GEL DE CALAMINE<br>THERICA *          |
| Hydrocortisone  | Crème ou pommade: 1% (acétate).                                | x                | x   | x  | x    | x(D) | Cortapaisyl                           |
| <b>11.4 Médicaments de la différenciation et de la prolifération cutanées</b> |  |                  |     |    |      |      |                                       |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                             | FORMES ET DOSAGES            | Zones Sanitaires |     |    |     |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|------------------------------|------------------|-----|----|-----|------|------------------------------------|
|   |                              | CHU              | CHD | HZ | CSC | GSA  |                                    |
| Acide salicylique                       | Solution: 5%.                | x                | x   | x  | x   | x(D) | CORICIDE LE DIABLE                 |
| Goudron de houille                      | Solution: 5%.                | x                | x   | x  | x   | x(D) | ALKOTAR*                           |
| Péroxyde de benzoyle                    | Crème ou lotion: 5%          | x                | x   | x  | x   | x(D) | ECLARAN, CUTACNYL,<br>PANNOGEL*    |
| Résine de podophylle                    | Solution: 10% à 25%.         | x                | x   | x  | x   | x(D) | Résine de podophylle*              |
| Urée                                    | Crème ou pommade: 5%; 10%.   | x                | x   | x  | x   | x(D) | Urée*                              |
| <b>11.5 Scabicides et pédiculicides</b> |                              |                  |     |    |     |      |                                    |
| Benzoate de benzyle                     | Lotion: 25%.                 | x                | x   | x  | x   | x    | Ascabiol, Acaribial                |
| Perméthrine                             | Crème: 5%.<br>Lotion: 1%.    | x                | x   | x  | x   | x    | PARA PLUS*;<br>PYREFLOR*           |
| <b>12. PRODUITS DE DIAGNOSTIC</b>       |                              |                  |     |    |     |      |                                    |
| <b>12.1 En ophtalmologie</b>            |                              |                  |     |    |     |      |                                    |
| Fluorescéine                            | Collyre: 1% (sel de sodium). | x                | x   | -  | -   | -    | fluorescéine*                      |
| Tropicamide                             | Collyre: 0,5%.               | x                | x   | -  | -   | -    | Mydriaticum                        |
| <b>12.2 Produits de contraste R</b>     |                              |                  |     |    |     |      |                                    |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                         | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|-------------------------------------|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|                                     |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| <i>Liste complémentaire</i>         |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Sulfate de baryum                   | <i>Suspension aqueuse.</i>  | x                | x   | -  | -   | -   | Micropaque                         |
| Amidocrysoate de sodium             | Solution buvable ou rectale 370mg/ml                                | x                | x   | -  | -   | -   | Gastrophine                        |
| Ioxitalamate de méglumine           | Injectable: 250 mg/ml (iode) , solution en flacon de 20 ml          | x                | x   | x  | -   | -   | Télébrix hystéro                   |
|                                     | Injectable: 300 mg/ml (iode) , solution en flacon de 100 ml         | x                | x   | x  | -   | -   | Télébrix 30                        |
| Iode 38%                            | 480 mg/ml 10 ml inj   | x                | x   | x  | -   | -   | Lipiodol ultra fluide              |
| Ioxaglate de sodium et de méglumine | Solution injectable: 320 mg/ml, flacon 20 et 50 ml                  | x                | x   | x  | -   | -   | Hexabrix 320,<br>Radiosélectan     |
| Adipidon de méglumine               | Flacon 250 ml   | x                | x   | x  | -   | -   | Transbilix (Sup)                   |
| Ioxitalamate de méglumine           | Injectable: 350 mg/ml solution en flacon 50 ml                      | x                | x   | x  | -   | -   | Télébrix 35                        |
| Acide gadotérique                   | Solution injectable à 0,5 mmol/ml, flacon de 5 ml et 10 ml          | x                | -   | -  | -   | -   | Artirem; Dotarem                   |
| Ioxitalamate de sodium              | Injectable: 120 mg/ml solution en flacon 250 ml                     | x                | x   | x  | -   | -   | Télébrix 12                        |
| <b>13. ANTISEPTIQUES</b>            |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Chlorhexidine digluconate           | Solution: 7,1% (digluconate) gel pour les soins du cordon ombilical | x                | x   | x  | x   | x   | chlorhexidine Chlorxy-G            |
| Ethanol (Alcool)                    | <b>Solution:</b> 70% (dénaturé).                                    | x                | x   | x  | x   | x   | Alcool officinal                   |
| Eosine aqueuse                      | Solution 2%   | x                | x   | x  | x   | x   | Eosine aqueuse                     |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|--|---|------------------|-----|----|-----|------|---|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA  |   |
| Povidone iodée                                       | Solution à 10% (soit 1% d'iode disponible).   | x                | x   | x  | x   | x    | Bétadine  |
| <b>14. DIURETIQUES</b>                               |   |                  |     |    |     |      |   |
| Furosémide   | Comprimé: 10 mg; 20 mg; 40 mg.<br>Forme buvable: 20 mg/5 ml.<br>Solution injectable: 10 mg/ml en ampoule de 2 ml. | x                | x   | x  | x   | x(D) | Lasilix   |
| Hydrochlorothiazide                                  | Comprimé (sécable): 25 mg.  | x                | x   | x  | -   | -    | Esidrex   |
| Mannitol   | Solution injectable: 10%; 20%.  | x                | x   | x  | -   | -    | MANNITOL B BRAUN  |
| Spironolactone                                       | Comprimé: 25 mg.<br>Forme buvable: 5 mg/5 ml; 10 mg/5 ml; 25 mg/5 ml.   | x                | x   | x  | -   | -    | Aldactone   |
| <b>15. MEDICAMENTS INDIQUES EN GASTROENTEROLOGIE</b> |   |                  |     |    |     |      |   |
| Enzymes pancréatiques                                | Formulations et doses adaptées à l'âge, notamment pour la lipase, la protéase et l'amylase.                       | x                | x   | -  | -   | -    | Eurobiol*; Creon*   |
| <b>15.1 Anti-acides et autres anti-ulcéreux</b>      |   |                  |     |    |     |      |   |
| Hydroxyde d'aluminium                                | Comprimé: 500 mg.<br>Forme buvable: 320 mg/5 ml.  | x                | x   | x  | x   | x    | Maalox, Gastromag, Gastrogel, Hydroxyde d'aluminium + Magnésium CREAT, Mutesa |
| Hydroxyde de magnésium                               | Forme buvable: correspondant à 550 mg d'oxyde de magnésium/10 ml.   | x                | x   | x  | x   | x    | Maalox, Gastromag, Gastrogel, Hydroxyde                                       |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION                    | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                                |
|--------------------------------|---|------------------|-----|----|-----|------|---|
|                                |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA  |   |
|                                |   |                  |     |    |     |      | d'aluminium + Magnésium<br>CREAT, Mutesa                          |
| Oméprazole                     | Forme solide pour voie orale: 10 mg; 20 mg; 40 mg.<br>Poudre pour forme buvable: sachets de 20 mg; 40 mg.   | x                | x   | x  | x   | x(D) | Lomac, Mopral, gaspral  |
| Ranitidine                     | Comprimé: 150 mg (sous forme de chlorhydrate).<br>forme buvable: 75 mg/5 ml (sous forme de chlorhydrate).<br>solution injectable: 25 mg/ml (sous forme de chlorhydrate) en ampoule de 2 ml. | x                | x   | x  | x   | x(D) | Azantac, Rani Denk,<br>Rubiulcer, Ranimat,<br>Antagonine, Ranitic |
| <b>15.2 Anti-émétiques</b>     |   |                  |     |    |     |      |   |
| Métopimazine                   | goutte buvable: 0,4% flacon de 30ml<br>Suppositoire sécable : 5mg<br>Lyophilisat oral<br>:7,5mg<br>Solution<br>Buvable: 0,1% flacon 150ml   | x                | x   | x  | x   | x(D) | Vogalène  |
| lévosulpiride                  | Comprimé: 25mg ;  | x                | x   | x  | x   | x    | Dislep  |
|                                | Injectable: 25mg  | x                | x   | x  |     |      |   |
| Métoclopramide                 | Comprimé: 10 mg (chlorhydrate).<br>Forme buvable: 5 mg/5 ml.<br>Solution injectable: 5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml.   | x                | x   | x  | x   | x(D) | Primperan   |
| Ondansétron                    | Forme buvable: 4 mg de base/5 ml.<br>Forme solide pour voie orale: Eq 4 mg de base; Eq 8 mg de base.<br>Solution injectable: 2 mg de base/ml en ampoule de 2 ml (chlorhydrate).             | x                | -   | -  | -   | -    | Zophren*  |
| <b>15.3 Antihémorroïdaires</b> |   |                  |     |    |     |      |   |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| Fraction flavonoïque purifiée                         | 1Comprimé: 1000 mg   | x                | x   | x  | x   | x   | Daflon                             |
| Ruscus + Hepéridine méthyl-chalcone+ acide ascorbique | Gélule: 150/150/100mg amp buvable et gélule  | x                | x   | x  | x   | x   | Cyclo 3 fort                       |
| <b>15.4 Anti-spasmodiques</b>                         |  |                  |     |    |     |     |                                    |
| Drotavérine   | Comprimé: 40mg et 80 mg<br>Injectable: 40mg/2ml inj  | x                | x   | x  | x   | x   | No-spa                             |
| <b>15.3 Médicaments utilisés dans la diarrhée</b>     |  |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>15.3.1 Médicaments pour la réhydratation</b>       |  |                  |     |    |     |     |                                    |
| Sels de rehydratation orale                           | glucose: 75 mEq<br>sodium: 75 mEq ou mmol/L<br>chlorure: 65 mEq ou mmol/L<br>potassium: 20 mEq ou mmol/L<br>citrate: 10 mmol/L<br>osmolarité: 245 mOsm/L<br>glucose: 13,5 g/L<br>chlorure de sodium: 2,6 g/L<br>chlorure de potassium: 1,5 g/L<br>citrate trisodique di hydraté+: 2,9 g/L<br>+ Le citrate trisodique di hydraté peut être remplacé par l'hydrogénocarbonate de sodium (bicarbonate de sodium), 2,5 g/L.<br><br>Toutefois, la stabilité de cette dernière préparation étant très médiocre sous climat tropical, elle ne peut être recommandée que pour un usage immédiat.<br><b>Poudre à diluer dans 200 ml; 500 ml; 1 L.</b> | x                | x   | x  | x   | x   | Orasel, Osmule                     |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|---|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| <b>15.3.2 Anti diarrhéiques à usage pédiatrique</b>                  |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Sulfate de Zinc  | Forme solide pour voie orale: 20 mg.<br>NB:En cas de diarrhée aiguë, le sulfate de zinc est utilisé comme adjuvant de la réhydratation orale. | x                | x   | x  | x   | x   | Orasel-Zinc                        |
| Lopéramide   | Solution buvable 0,2mg/ml<br>Gélule 2mg   | x                | x   | x  | x   | x   | Imodium                            |
| Charbon activé + levure  | Poudre pour suspension 100 mg<br>Comprimé 50mg 200mg  | x                | x   | x  | x   | x   | Carbolevure                        |
| Saccharomyces  | Poudre pour suspension 100 mg<br>Gélule 50mg 200mg  | x                | x   | x  | x   | x   | Ultra levure                       |
| <b>16. HORMONES ET AUTRES MEDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE</b> |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>16.1 HORMONES HYPOTHALAMIQUES</b>                                 |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>16.1.1 AGONISTES DE LA LH-RH</b>                                  |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Triptoreline   | Injectable :3mg   | x                | x   | -  | -   | -   | Decapeptyl                         |
| Leuproreline   | Injectable : 3,75mg   | x                | x   | -  | -   | -   | Enantone                           |
| <b>16.1.2 HORMONES DE CROISSANCE</b>                                 |   |                  |     |    |     |     |                                    |
| Mécasermine  | Injectable : 10 mg/ml Solution sous cutanée, Flacon de 4 ml   | X                | -   | -  | -   | -   | Increlex                           |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)         |
|---|---|------------------|-----|------|------|-----|--|
|   |   | CHU              | CHD | HZ   | CSC  | CSA |  |
| Somatropine   | Injectable : 5,3 mg et 12 mg Poudre pour solution injectable sous cutanée   | X                | -   | -    | -    | -   | Genotonorm, Norditropine                   |
| <b>16.1.3 HORMONES HYPOPHYSAIRES</b>                    |   |                  |     |      |      |     |  |
| FSH purifié   | injectable :75UI, 150 UI  | X                | -   | -    | -    | -   | Puregon                                    |
| Desmopressine   | comprime sublinguale: 120 microgramme   | X                | -   | -    | -    | -   | Minirinmelt                                |
| <b>16.2 Hormones pancréatiques</b>                      |   |                  |     |      |      |     |  |
| Glucagon  | Solution injectable: 1 mg/ml.   | x                | x   | x(D) | -    | -   | Glucagen*                                  |
| Insuline injectable (soluble) rapide                    | <b>Solution injectable:</b> 100 UI/ml en flacon de 10 ml.   | x                | x   | x(D) | -    | -   | Actrapid, Umuline                          |
| Insuline mixte  | <b>Solution injectable:</b> 100 UI/ml en flacon de 10 ml (sous forme d'un complexe d'insuline zinc en suspension ou d'insuline isophane). | x                | x   | x(D) | -    | -   | Mixtard                                    |
| Insuline retard   | <b>Solution injectable:</b> 100 UI/ml en flacon de 10 ml  | x                | x   | x(D) | -    | -   | Insulatard                                 |
| <b>16.3 Antidiabétiques oraux</b>                       |   |                  |     |      |      |     |  |
| <b>Biguanides</b>                                       |   |                  |     |      |      |     |  |
| Metformine  | Comprimé: 500 mg (chlorhydrate).  | x                | x   | x    | x(U) | -   | Glucophage, Metforal, Dimet, Meformin Denk |
| <b>Sulfamides</b>                                       |   |                  |     |      |      |     |  |
| Glimepiride   | comprimés: 1mg, 2mg,3mg,4mg,, à partir de 8ans  | x                | x   | x    | x(U) | -   | Amarel                                     |
| <b>16.4 HORMONES THYROÏDIENNES ET ANTITHYROÏDIENNES</b> |   |                  |     |      |      |     |  |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|--|------------------|-----|------|-----|-----|------------------------------------|
|  |  | CHU              | CHD | HZ   | CSC | CSA |                                    |
| Lévothyroxine ( <i>L-thyroxine</i> )                           | Comprimé: 25 microgrammes; 50 microgrammes;<br>100 microgrammes (sel de sodium).<br>Gouttes buvables 5microgramme/gtte | x                | x   | -    | -   | -   | levothyrox                         |
| <b>Liste complémentaire</b>                                    |  |                  |     |      |     |     |                                    |
| Iodure de potassium  | Comprimé: 60 mg.   | x                | x   | x    | -   | -   | iodure de potassium*               |
| Thiouracile  | Comprimé: 25mg et 50 mg  | x                | x   | x    | -   | -   | propylthiouracil R* ,Basdène,      |
| Carmibazole  | Comprimé : 5mg, 20mg   | x                | x   | x    | -   | -   | Neomercazole                       |
| Thiamazole   | Comprimé : 5mg, 10mg,20mg  | x                | x   | x    | -   | -   | Thyrozol*                          |
| solution de Lugol  | Forme buvable: environ 130 mg d'iode total/ml.   | x                | x   | x    | -   | -   | solution de Lugol*                 |
| <b>16.5 Hormones surrénaliennes et corticoïdes de synthèse</b> |  |                  |     |      |     |     |                                    |
| <b>16.5.1 GLUCOCORTICOIDES</b>                                 |  |                  |     |      |     |     |                                    |
| Fludrocortisone  | Comprimé:100 microgrammes (acétate), Comprime :50 µg   | x                | x   | x(D) | -   | -   | Adixone*,Flucortac                 |
| Hydrocortisone   | Comprimé: 5 mg;10 mg; 20 mg,<br>Injectable100mg  | x                | x   | x(D) | -   | -   | hydrocortisone                     |
| <b>16.5.2 CATECHOLAMINES SURRENALIENNES</b>                    |  |                  |     |      |     |     |                                    |
| Norépinéphrine   | injectable ampoule : 4ml dosée à 4mg   | x                | x   | x    | -   | -   | Levophed                           |
| Epinéphrine  | injectable ampoule : 1ml dosée à 1mg et 5mg  | x                | x   | x    | -   | -   | Adrénaline                         |
| Isoproterenol,   | injectable ampoule : 1ml dosée à 0,2mg   | x                | x   | x    | -   | -   | Isuprel                            |
| Dopamine   | injectable ampoule : 5ml de 200mg  | x                | x   | x    | -   | -   | Dopamine                           |
| Dobutamine   | injectable ampoule : 250 mg  | x                | x   | x    | -   | -   | Dobutrex                           |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |      |      |      |           | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|--|------------------|------|------|------|-----------|------------------------------------|
|  |  | CHU              | CHD  | HZ   | CSC  | CSA       |                                    |
| <b>16.6 HORMONES TESTICULAIRES</b>                                       |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| oenanthate de Testosterone   | Injectable: 250mg/1mL  | X                | X    | -    | -    | -         | Androtardyl                        |
| <b>16.7 ANTIANDROGENES</b>   |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| Acétate de cyproterone   | Comprime : 50mg, 100mg   | X                | X    | -    | -    | -         | Androcur                           |
| <b>16.8 Hormones ovariennes</b>  |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| ethinyl œstradiol  | Comprimé 50 µg   | X                | X    | -    | -    | -         | ethinyl œstradiol EFFIK*           |
| <b>17. PREPARATIONS POUR L'IMMUNOLOGIE</b>                               |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| <b>17.1 Produits de diagnostic</b>                                       |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| Tuberculine, dérivé protéinique purifié (PPD)                            | <b>Solution injectable.</b>  | x                | x    | x(D) | -    | -         | tuberculine SANOFI PASTEUR         |
| <b>17.2 Sérums et immunoglobulines</b>                                   |  |                  |      |      |      |           |                                    |
| Antitoxine diphtérique   | Solution injectable: 10 000 UI; 20 000 UI en flacon.   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R)      |                                    |
| Sérum antirabiques   | Solution injectable: Fragments F (ab') 2 d'immunoglobuline équine rabique (1000 UI).           | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R)      | humain/Véro; Favirab               |
| Immunoglobulines antivenimeuses [Antivenin de serpent Polyvalent F(ab)2] | préparation lyophilisée pour solution injectable en iv contenant 200mg de protéine             | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R)<br>D | Inoserp Panafricain                |
| immunoglobulines humaines antitétaniques ( <b>sérum antitétanique</b> )  | fragments d'immunoglobulines tétaniques dosés à 1500 UI /ml en seringue injectable pré remplie | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R)      | Tetanea                            |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |      |      |      |      | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                                |
|--|---|------------------|------|------|------|------|---|
|  |   | CHU              | CHD  | HZ   | CSC  | CSA  |   |
| <b>17.3 Vaccins</b>  |   |                  |      |      |      |      |   |
| vaccin par le BCG (Immunisation active contre la tuberculose)                              | poudre solvant pour suspension injectable   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | VACCIN BCG SSI  |
| Vaccin antiamaril (virus de fièvre jaune atténué)  | Flacon lyophilisé de 10 doses   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Stamaril  |
| Vaccin pentavalent (anti Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B-Hémophilus influenzae B ) | inj 5ml flacon de 10 doses  | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) |      |   |
| Vaccin monovalent anti-hépatite B  | solution injectable: 10µ en seringue injectable pré remplie                           | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Engerix B enfant, Euvax pédiatrique                               |
| vaccin antiméningococcique   | poudre et solvant pour suspension injectable en seringue pré remplie                  | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Meningo A+C; Mencevax<br>Meningo A+C YW135,<br>Meningo A conjugué |
| Vaccin antipneumococcique (PCV13)  | Solution injectable (IM, SC) : Seringue pré remplie de 0,5 ml                         | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Prevenar  |
| Vaccin antipoliomyélitique orale (VPO)   | solution orale flacon de 20 doses (VPO)   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | VPO   |
| Vaccin poliomyélitique inactivé  | solution injectable en seringue pré-remplie flacon de 0,5 ml flacon de 10 doses (VPI) | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | IMOVAX POLIO*   |
| Vaccin antirabique   | poudre et solvant pour suspension injectable  | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Verorab   |
| Vaccin antirotavirus   | poudre et solvant pour suspension buvable flacon de 2 doses                           | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Rotarix   |
| Vaccin anti rougeole et anti rubéole (R R )  | flacon lyophilisé de 10 doses   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Vaccin R R  |
| vaccin antitétanique   | solution injectable : en seringue pré remplie (40UI)                                  | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | Tetavax   |
| Vaccin contre le Virus du Papillome Humain (HPV ou Human Papilloma Virus)                  | flacon liquide de 2 doses   | x(R)             | x(R) | x(R) | x(R) | x(R) | CERVARIX  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES                       | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)    |
|---|---|------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------------|
|   |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                       |
| <b>18. MYORELAXANTS (PERIPHERIQUES) ET INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE</b> |   |                  |     |    |     |     |                                       |
| Thiocolchicoside  | 4 mg comp                               | x                | X   | X  | X   | -   | Coltramy,<br>Miorel, Myoplège         |
| Adénosine triphosphate  | 30 mg gélule                            | x                | X   | X  | X   | -   | Atépadène                             |
| Mephenesine   | Comprime : 500mg et pommade             | X                | X   | X  | X   | -   | Decontractyl                          |
| <b>19. PREPARATIONS POUR L'OPHTALMOLOGIE</b>                                |   |                  |     |    |     |     |                                       |
| <b>19.1 Anti-infectieux</b>   |   |                  |     |    |     |     |                                       |
| Aciclovir   | Pommade: 3% P/P.                        | x                | x   | x  | x   | -   | Zovirax                               |
| Azithromicine   | collyre : 1,5%                          | x                | x   | x  | x   | -   | Azyter                                |
| Ofloxacin <sup>WA</sup>   | collyre : 0,3%                          | x                | x   | x  | x   | -   | Exocine, flox-sol                     |
| Gentamicine <sup>A</sup>  | Solution (collyre): 0,3% (sulfate).     | x                | x   | x  | x   | -   | Gentasol, Gentalline,<br>Genta-Philco |
| Tétracycline  | Pommade ophtalmique: 1% (chlorhydrate). | x                | x   | x  | x   | -   | Auréomycine                           |
| Hexamidine  | Collyre : 0,1%                          | x                | x   | x  | -   | -   | Désomédine                            |
| <b>19.2 Antiallergiques</b>   |   |                  |     |    |     |     |                                       |
| acide N- acetyl aspartyl glutamique   | Collyre : 4,9%                          | x                | x   | x  | x   | -   | Naabak                                |
| cromoglycate de sodium  | Collyre : 2%                            | x                | x   | x  | x   | -   | Opticron, Cromoptic,<br>Cromsol       |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                    | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)         |
|--|--|------------------|-----|----|------|-----|--|
|  |  | CHU              | CHD | HZ | CSC  | CSA |  |
| Levocabastine                                  | Collyre : 0,5%   | x                | x   | x  | x    | -   | Levophta                                   |
| <b>19.3 Anti-inflammatoires</b>                |  |                  |     |    |      |     |  |
| Indométacine                                   | Collyre  | x                | x   | x  | x    | x   | Indocollyre                                |
| Néomycine + dexaméthasone                      | 1% solution opht   | x                | x   | x  | -    | -   | Chibro Cadron, Maxidrol                    |
| Tobramycine + dexaméthasone                    | collyre  | x                | x   | x  | -    | -   | Tobradex                                   |
| Oxytétracycline + dexaméthasone                | collyre  | x                | x   | x  | -    | -   | Sterdex*                                   |
| Prednisolone                                   | Solution (collyre): 0,5% (phosphate de sodium).  | x                | x   | x  | x(D) | -   | Optipred                                   |
| <b>19.4 Anesthésiques locaux</b>               |  |                  |     |    |      |     |  |
| Oxybuprocaine chlorhydrate                     | Collyre : 1%   | x                | x   | x  | -    | -   | Novésine*,<br>Oxybuprocaine*,<br>Cébésine* |
| Lidocaïne                                      | Injectable 2%; gel ophtalmique : 5%;   | x                | x   | x  | -    | -   | Xylocaïne                                  |
| Tétracaïne                                     | Solution (collyre): 0,5% (chlorhydrate).<br>Ne pas administrer chez le nouveau-né prématuré. | x                | x   | x  | -    | -   | TETRACAINE FAURE*                          |
| Bupivacaïne                                    | Injectable : 0,5% flacon de 10 ml  | x                | x   | x  | -    | -   | Bupivacaine MYLAN                          |
| <b>19.5 Miotiques et antiglaucomateux</b>      |  |                  |     |    |      |     |  |
| Pilocarpine *(traitement du glaucome juvenile) | Collyre : 2%   | x                | x   | x  | -    | -   | Isopto pilocarpine                         |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|--|---|------------------|-----|----|-----|-----|---|
|  |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| Timolol *(traitement du glaucome juvenile)                       | Collyre : 0,25% et 0,5 %  | x                | x   | x  | -   | -   | Timoptol, Cusinolol, Nyolol   |
| Acétazolamide *(traitement du glaucome juvenile)                 | Comprimé : 250mg; injectable : 500mg  | x                | x   | x  | -   | -   | Diamox  |
| Dorzolamide  | Collyre : 20 mg/ml flacon 5 ml  | x                | x   | x  | -   | -   | Trusopt   |
| Latanoprost *(traitement du glaucome juvenile)                   | Collyre : 0,005%  | x                | x   | x  | -   | -   | Zalatan, Lacoma, Travatan   |
| <b>19.6 Mydriatiques</b>   |   |                  |     |    |     |     |   |
| Atropine (*)   | Solution (collyre): 0,5%; 1% (sulfate)<br>(*) enfant de plus de 3 mois                              | x                | x   | x  | -   | -   | Atropine  |
| Tropicamide  | Collyre : 0,5%  | x                | x   | x  | -   | -   | Mydriaticum   |
| phényléphrine  | Collyre : 10%   | x                | x   | x  | -   | -   | Néosinéprine*   |
| épinéphrine (adrénaline)   | Solution (collyre): 2% (sous forme de chlorhydrate)   | x                | x   | x  | -   | -   | Adrénaline AGUETTANT*,<br>Adrénaline RENAUDIN*  |
| <b>20. SOLUTIONS POUR DIALYSE PERITONEALE</b>                    |   |                  |     |    |     |     |   |
| <i>Liste complémentaire</i>                                      |   |                  |     |    |     |     |   |
| Solution DPCA  | Solution pour dialyse péitonéale : 1% stay safe ; 1,5% stay safe ; 2,5% stay safe ; 4,25% stay safe | x                | -   | -  | -   | -   | DPCA  |
| Solution pour dialyse péritonéale<br>(de composition appropriée) | Solution pour voie parentérale.   | x                | -   | -  | -   | -   | DIALYSE PERITONEALE<br>CONTINUE<br>AMBULATOIRE 2*,<br>DIALYSE PERITONEALE<br>CONTINUE<br>AMBULATOIRE 3* |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                                      | FORMES ET DOSAGES   | Zones Sanitaires |      |      |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|---|------------------|------|------|-----|-----|------------------------------------|
|  |   | CHU              | CHD  | HZ   | CSC | CSA |                                    |
| <b>21. PSYCHOTROPES</b>                          |   |                  |      |      |     |     |                                    |
| <b>21.1 Antipsychotiques</b>                     |   |                  |      |      |     |     |                                    |
| Chlorpromazine                                   | <i>Comprimé: 10 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg (chlorhydrate).<br/>Forme buvable: 25 mg (chlorhydrate)/5 ml.<br/>Solution injectable: 25 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml.</i> | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Largactil                          |
| Halopéridol                                      | <i>Forme buvable: 2 mg/ml.<br/>Forme solide pour voie orale: 0,5 mg; 2 mg; 5 mg.<br/>Solution injectable: 5 mg en ampoule de 1 ml.</i>  | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Haldol                             |
| Rispéridone                                      | Comprimé : 1mg; 2 mg; 4mg<br>Solution buvable : 1mg/ml  | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Risperidal*                        |
| <b>21.2 Médicaments des troubles de l'humeur</b> |   |                  |      |      |     |     |                                    |
| <b>21.2.1 Antidépresseurs</b>                    |   |                  |      |      |     |     |                                    |
| Fluoxétine                                       | <i>Forme solide pour voie orale: 20 mg (présente sous forme de chlorhydrate)</i>  | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Prozac                             |
| Amitriptyline                                    | gouttes à 4% (1mg/goutte)   | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Laroxyl gouttes                    |
| Clomipramine                                     | comprimé 10mg   | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Anafranil                          |
| <b>21.2.2 Normothymiques</b>                     |   |                  |      |      |     |     |                                    |
| Carbamazépine                                    | Suspension buvable 20mg/ml<br>Comprimé 200mg et 400mg   | x                | x(D) | x(D) | -   | -   | Tégrétoil                          |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |      |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)             |
|--|--|------------------|------|------|------|-----|--|
|  |  | CHU              | CHD  | HZ   | CSC  | CSA |  |
| <b>21.2.3 Anxiolytiques et Hypnotiques</b>                                     |  |                  |      |      |      |     |  |
| Hydroxyzine  | Comprimé: 25 mg<br>Sirop à 2mg/ml  | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Atarax   |
| Prométhazine   | Comprimé: 25 mg<br>Sirop à 5mg/càc   | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Phénergan                                      |
| Lorazépam  | Comprimé: 1mg et 2,5mg   | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Temesta  |
| <b>21.2.4 Médicaments des programmes de traitement des états de dépendance</b> |  |                  |      |      |      |     |  |
| Méthadone chlorhydrate   | Sirop 5mg/3,75mL, 10mg/7,5mL, 20mg/15mL, 40mg/15mL, 60mg-15mL;<br>gél 1,5,10,20,40mg           | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Méthadone                                      |
| <b>22. MEDICAMENTS INDIQUES EN PNEUMOLOGIE</b>                                 |  |                  |      |      |      |     |  |
| <b>22.3 Anticholinergique</b>  |  |                  |      |      |      |     |  |
| Ipratropium  | Spray buccal : flacon de 20 µg   | x                | X    | -    | -    | -   | ATROVENT                                       |
| <b>22.4 Corticoïdes</b>  |  |                  |      |      |      |     |  |
| Béclométhasone   | Embout buccal 250µg  | x                | x    | -    | -    | -   | Bécotide                                       |
| <b>22.5 ANTITUSSIFS ET MUCOREGULATEURS</b>                                     |  |                  |      |      |      |     |  |
| <b>22.5.1 TOUX SECHE</b>   |  |                  |      |      |      |     |  |
| Dextrometorphane   |  | x                | x    | x    | X(D) | -   | Drill toux sèche. Guaflex                      |
| <b>22.5.2 TOUX GRASSE</b>  |  |                  |      |      |      |     |  |
| Carbocistéine  | Sirop: 2%  | x                | x    | x    | x    | x   | Fluditec, Rhinatiol, Exomuc, Drill toux grasse |
| Ambroxol   |  | x                | x    | x    | x    | x   | Ambroxol, Muxol                                |
| <b>22.6 Anti-asthmatique</b>   |  |                  |      |      |      |     |  |
| Budesonide   | Suspension pour inhalation en gél de 100 , 200 et 400µg<br>Inhalation par nébuliseur 0,5mg/2mL | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Pulmicort*                                     |



**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION  | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |      |      |      |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|--|--|------------------|------|------|------|-----|------------------------------------|
|  |  | CHU              | CHD  | HZ   | CSC  | GSA |                                    |
| Salbutamol   | Inhalateur doseur (aérosol): 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose.<br>Solution injectable: 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml.<br>Solution pour nébuliseur: 5 mg (sous forme de sulfate)/ml. | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | Ventoline, buto-Asma, Salbutus     |
| Terbutaline  | Injectable : 0,5mg   | x                | x(D) | x(D) | -    | -   | BRICANYL                           |
|  | Comprime LP : 50mg   | x                | x(D) | x(D) | -    | -   |                                    |
|  | Aérosol : 0,5mg  | x                | x(D) | x(D) | -    | -   |                                    |
| <b>23. CORRECTION DES TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES</b> |  |                  |      |      |      |     |                                    |
| <b>23.1 Voie orale</b>   |  |                  |      |      |      |     |                                    |
| Chlorure de potassium  | Gélules 600mg; Comp LP 600 mg et 1000mg  | x                | x    | x    | x    | x   | Diffu-K; Kaléorid LP               |
| Chlorure de potassium+glycérophosphate de potassium                        | sirop 50mg/ml flacon 250ml<br>Sachet : 440mg/15ml  | x                | x    | x    | x    | x   | Potassium Richard*                 |
| Sels de réhydratation orale + Zinc   | Sachet pour 1 litre de solution  | x                | x    | x    | x    | x   | Orasel*, SRO-Zinc*                 |
| <b>23.2 Voie parentérale</b>   |  |                  |      |      |      |     |                                    |
| Bicarbonate de sodium  | 1,4% amp 10 ml inj; 4,2% amp de 10mL et 20mL   | x                | x    | x    | x(M) | -   |                                    |
| Serum bicarbonaté  | 1,4% - flacon 250 ml Perfusion   | x                | x    | x    | x(M) | -   |                                    |
|  | 1,4% - flacon 500 ml Perfusion; 4,2% flacon de 125 à 500 mL  | x                | x    | x    | x(M) | -   |                                    |
| Chlorure de potassium  | 10% amp de 10 ml inj   | x                | x    | x    | x    | x   |                                    |
| Chlorure de sodium   | 10% amp 10 ml inj  | x                | x    | x    | x    | x   |                                    |
| Calcium chlorure   | 10% ampoule de 10mL  | x                | x    | x    | x    | x   |                                    |
| Serum Salé   | 0,9% flacon 250 ml et 500 ml Perfusion   | x                | x    | x    | x    | x   |                                    |
| Serum glucosé  | 5% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml   | x                | x    | x    | x    | x   | Dextrose                           |
|  | 10% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml  | x                | x    | x    | x    | x   |                                    |
|  | 30% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml  | x                | x    | x    | -    | -   |                                    |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                               | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)  |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                     |
|   | 30% amp de 10mL; 20mL  | x                | x   | x  | -   | -   |                                     |
| Lactate de sodium composé                 | flacon 250 ml Perfusion et 500 ml  | x                | x   | x  | x   | x   | Ringer lactate, Darrow*             |
| <b>23.3 Divers</b>                        |  |                  |     |    |     |     |                                     |
| Eau pour préparations injectables         | En ampoules de 5 ml; 10 ml.  | x                | x   | x  | x   | x   | EPPI                                |
| <b>24. VITAMINES ET ELEMENTS MINERAUX</b> |  |                  |     |    |     |     |                                     |
| Acide ascorbique                          | Comprimé: 50 mg.   | x                | x   | x  | x   | x   | Cévit                               |
| Cholécalciférol*                          | Forme buvable: 400 UI/ml. Forme solide pour voie orale: 400 UI; 1000 UI.<br>* Peut être remplacé par de l'ergocalciférol.  | x                | x   | x  | x   | x   | Dedrogyl*                           |
| Calcitriol (1-25 dihydroxycholéciferol)   | Capsule molle : 0,25µg   | x                | x   | x  | x   | x   | Rocaltrol*                          |
| Fluorure de sodium                        | N'importe quelle forme topique appropriée.   | x                | x   | x  | x   | x   | Zymafluor                           |
| Iodine                                    | Capsule: 200 mg.<br>huile iodée: 1 ml (480 mg d'iode); 0,5 ml (240 mg d'iode) en ampoule (buvable ou injectable); 0,57 ml (308 mg d'iode) en flacon distributeur.  | x                | x   | x  | x   | x   | iodine*                             |
| Pyridoxine                                | Comprimé: 25 mg (chlorhydrate).  | x                | x   | x  | x   | x   | Pyridoxine<br>PHARMAQUICK, Chabre*  |
| Rétinol                                   | apsule: 100 000 UI; 200 000 UI (sous forme de palmitate).<br>Comprimé : 10 000 UI (sous forme de palmitate).<br>Solution buvable dans l'huile: 100 000 UI (sous forme de palmitate)/ml en flacon doseur.<br><br>Slution injectable miscible dans l'eau: 100 000 UI (sous forme de palmitate) en ampoule de 2 ml. | x                | x   | x  | x   | x   | Arovit*, CERNEVIT*                  |
| Riboflavine                               | Comprimé: 5 mg.  | x                | x   | x  | x   | x   | B vit fort, Becidouze,<br>Becozyme. |
| Thiamine                                  | Comprimé: 50 mg (chlorhydrate).  | x                | x   | x  | x   | x   | PrinciB fort, Becozyme              |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif) |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------------|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |                                    |
| Cyanocobalamine (Vit B12)   | comp 1mg ,250µg; injectable ou buvable1000µg/4mL; 100µg                    | x                | x   | x  | x   | x   | Vitamine B12 Gerda                 |
| Vitamine B complex  | inj  | x                | x   | x  | x   |     | Bécozyme                           |
|   | comp   | x                | x   | x  | x   |     |                                    |
| Acide pantothénique   | Pommade 5%   | x                | x   | x  | x   | x   | Bepanthen pommade                  |
| Complexe vitaminique  | comprimé   | x                | x   | x  | x   | -   | Hydrosol; Multivitamine            |
|   | Sirop  |                  |     |    |     |     |                                    |
|   | Goutte : en flacon compte goutte de 20 ml                                  |                  |     |    |     |     |                                    |
| Aliment dietetique  | injectable : 1026 mL/900Kcal; 1540mL/1400cal;2053mL/1900Kcal               | X                | X   | -  | -   | -   | KABIVEN                            |
| Aliment dietetique  | oral: flacon de 300mL  | X                | X   | X  | -   | -   | RENUTRIL                           |
| Acides aminés (mélange)   | Capsule, sirop, solution buvable , solution inj                            | X                | X   | X  | X   | X   | Astymin                            |
| Multiple micronutriments  | poudre en sachet 1g  | x                | x   | x  | x   | x   | MNP* B/30 sachets                  |
| ATPE (Aliment Therapeutique Prêt a l'Emploi)                            | sachet (92g)/  | x                | x   | x  | x   | x   | Plumpy nut                         |
| Vitamines + minéraux + glucides + proteins + Lipides (Mélange)          | Poudre en boîte, 400g  | x                | x   | x  | -   | -   | Lait F-100 ; Lait F-75             |
| Oligoéléments + glucoses (mélange) *                                    | Poudre en sachet (84g)<br>(* ) Solution de rehydratation pour malnutrition | x                | x   | x  | -   | -   | ReSoMal                            |
| <b>25. AFFECTIONS DE L'OREILLE, DU NEZ ET DE LA GORGE CHEZ L'ENFANT</b> |  |                  |     |    |     |     |                                    |
| <b>25.1. AFFECTIONS DU NEZ</b>  |  |                  |     |    |     |     |                                    |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION                         | FORMES ET DOSAGES                             | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                            |
|-------------------------------------|---|------------------|-----|----|-----|-----|---|
|                                     |   | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |   |
| <b>25.1.1 Solutions nasales</b>     |   |                  |     |    |     |     |   |
| Serum physiologique                 | solution de NaCl isotonique                   | X                | X   | X  | X   | X   | SERUM SALE<br>ISOTONIQUE<br>PHYSIOMER, MARIMER, S<br>TERIMAR, |
| <b>25.1.2 Vasoconstricteurs</b>     |   |                  |     |    |     |     |   |
| Xylométazoline                      | Pulv nasale 0,05%                             |                  |     |    |     |     | Otrivine,<br>xylomépha, fastorik N<br>Enfant, après 3 mois    |
| Oxymetazoline                       | 0,05 %, 0,1 %                                 | X                | X   | X  | -   | -   | ATURGYL, XYLOMEPHA,<br>XYLOVIT                                |
| <b>25.1.3 anticholinergique</b>     |   |                  |     |    |     |     |   |
| Ipratropium                         | nasal 0, 25 mg/1ml, 0,25 mg/2 ml              | X                | X   | X  | -   | -   | ATROVENT  |
| <b>25.1.4 Corticoïdes</b>           |   |                  |     |    |     |     |   |
| Fluticasone                         | pulvérisation nasale 50 µg                    | X                | X   | X  | -   | -   | Flixonase Après 4 ans   |
| Mometazone                          | pulvérisation nasale 50 µg                    | X                | X   | X  | -   | -   | Nasonex Après 3 ans   |
| Triamcinolone                       | pulvérisation nasale 55 µg                    | X                | X   | X  | -   | -   | Nasacort, Après 6ans  |
| Budesonide                          | pulvérisation nasale 64 µg                    | X                | X   | X  | -   | -   | Rhinocort Après 6 ans   |
| Tixocortol Pivalat                  | 1% flacon de 10ml                             | X                | X   | X  | X   | -   | Pivalone  |
| <b>25.1.5 Autres topiques</b>       |   |                  |     |    |     |     |   |
| Acide trichloroacétique             |   | X                | X   | X  | -   | -   |   |
| Crayon au nitrate d'argent          |   | X                | X   | X  | -   | -   |   |
| <b>25. 2 Affection des oreilles</b> |   |                  |     |    |     |     |   |
| <b>25.2.1 Céruminolytiques</b>      |   |                  |     |    |     |     |   |
| Xylène                              | sol pour instillation auriculaire à 5 g/100 g | X                | X   | X  | X   | -   | Cérylyse, A cérumen   |
| <b>25.2.2 Antibiotiques</b>         |   |                  |     |    |     |     |   |
| Ofloxacine <sup>WA</sup>            | 1,5 mg/0,5 ml sol auriculaire                 | X                | X   | X  | X   | -   | Oflocet   |
| Ciprofloxacine <sup>WA</sup>        | 1,5 mg/0,5 ml sol auriculaire                 | x                | x   | x  | x   | -   | Cétraxal otico  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION   | FORMES ET DOSAGES  | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)             |
|---|--|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|   |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| <b>25.2.3 Antibiotiques + corticoïde+ autres</b>  |  |                  |     |    |     |     |  |
| Nystatine+ dexaméthasone + polymyxine B+oxytétracycline   | poudre   | X                | X   | X  | X   | -   | Auricularum poudre                             |
| Ciprofloxacine <sup>WA</sup> + dexaméthasone  | solution 3 mg/1mg/ml pour instillation auriculaire   | X                | X   | X  | X   | -   | Ciloxadex                                      |
| Polymyxine B +dexaméthasone   | flacon de 10,5 ml  | X                | X   | X  | X   | -   | Polydexa                                       |
| <b>25.3 Affections de la gorge</b>  |  |                  |     |    |     |     |  |
| Chlorhexidine + Tétracaïne  | sol pour bain de bouche et collutoire  | X                | X   | X  | X   | -   | Eludril  |
| Hexétidine  | solution de NaCl isotonique bain de bouche   | X                | X   | X  | X   | X   | Givalex, Hextril                               |
| Povidone iodée  | Solution buccale   | X                | X   | X  | X   | X   | Bétadine 10% pour bain de bouche et gargarisme |
| <b>26. MEDICAMENTS PROPRES AUX SOINS NEONATAUX</b>  |  |                  |     |    |     |     |  |
| Citrate de caféine  | Forme buvable: 20 mg/ml (correspondant à 10 mg de composé de caféine/ml).<br>Solution injectable: 20 mg/ml (correspondant à 10 mg de composé de caféine/ml). | x                | x   | x  | -   | -   | citrate de caféine*                            |
| <b>Liste complémentaire</b>   |  |                  |     |    |     |     |  |
| Ibuprofène  | Solution injectable: 5 mg/ml.  | x                | x   | x  | x   | x   | PEDEA*   |
| Prostaglandine E  | Solution injectable:<br>Prostaglandine E1: 0,5 mg/ml dans l'alcool.<br>Prostaglandine E2: 1 mg/ml.   | x                | -   | -  | -   | -   | PROSTINE E2*                                   |
| Surfactant  | Suspension pour instillation intratrachéale: 25 mg/ml ou 80 mg/ml.   | x                | -   | -  | -   | -   | Surfactant                                     |
| <b>27. MEDICAMENTS DES MALADIES ARTICULAIRES</b>  |  |                  |     |    |     |     |  |
| <b>27.1 Médicaments utilisés pour le traitement de fond des affections rhumatismales et des maladies articulaires juvéniles</b> |  |                  |     |    |     |     |  |

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune  
Internationale**

| DÉSIGNATION             | FORMES ET DOSAGES                        | Zones Sanitaires |     |    |     |     | SPECIALITES<br>(A titre indicatif)                 |
|-------------------------|--|------------------|-----|----|-----|-----|--|
|                         |  | CHU              | CHD | HZ | CSC | CSA |  |
| Méthotrexate            | 2 mg                                     | X                | -   | -  | -   | -   | Novatrex*, Ledertrexate*,<br>Methothrexate BELLON* |
| Hydroxychloroquine      | comprimé 200 mg                          | X                | -   | -  | -   | -   | Plaquenil*   |
| Sulfasalazine           | 500 mg                                   | X                | -   | -  | -   | -   | Salazopyrine*                                      |
| Azathioprine            | 25 mg , 50 mg                            | X                | -   | -  | -   | -   | Imurel*  |
| Chondroïtine sulfate    |  | x                | x   | x  | -   | -   | Chondrosulf gel, structum                          |
| Hyaluronate de sodium   | Injection Intra articulaire              | x                | x   | x  | -   | -   | Hyalgan  |
| Triamcinolone acetonide | Injectable : 40mg/1mL                    | x                | x   | x  | -   | -   | Kenacort retard                                    |
| Betaméthasone           | Séringue pré remplie Injectable 5mg, 2mg | x                | x   | x  | -   | -   | Diprostène   |

\* = Spécialité non enregistrée au Bénin

**LISTE DE MEMBRES DU COMITE AD HOC CHARGE DE LA  
RÉVISION DE LA LNME (8ème Edition)**

| N° ord. | Nom et Prénoms       | Qualification                                    |
|---------|----------------------|--|
| 1       | WANKPO Berger        | Pharmacien responsable des achats à la CAME      |
| 2       | ALLABI Aurel         | Médecin pharmacologue                            |
| 3       | HOUNGBE Fabien       | Médecin interniste au CNHU                       |
| 4       | ALLAMOU Soulé        | Médecin ophtalmologue au CNHU                    |
| 5       | LOKOSSOU Antoine     | Médecin gynécologue                              |
| 6       | ALAO Jules           | Médecin pédiatre au CHU-MEL                      |
| 7       | KLIKPEZO Roger       | Médecin gynécologue au HIA-CHU de Cotonou        |
| 8       | ADJIBABI Wallis      | Médecin spécialiste ORL au CNHU                  |
| 9       | GAZARD Dorothée      | Médecin spécialiste des maladies parasitaires    |
| 10      | ASSOUTO Pamphile     | Médecin urgentiste                               |
| 11      | AVAKOUDJO Josué      | Médecin spécialiste des affections uro-génitales |
| 12      | GBOVI Jules          | Médecin chirurgien au CHD Lokossa                |
| 13      | HOUNNOUKON Toussaint | Pharmacien hospitalier du CHD Porto -Novo        |
| 14      | PRUDENCIO Edgard     | Pharmacien d'officine                            |
| 15      | GBADAMASSI Limata    | Sage femme au Centre de Santé de Koussi          |
| 16      | DIATEMA Salim        | Médecin cardiologue à HZ Abomey-calavi           |
| 17      | ZINSOU Michel        | Infirmier au Centre de Santé de Pahou            |
| 18      | TCHABI Yossounon     | Pharmacien au Service de Santé des Armées        |
| 19      | SODABI Nicolas       | DAPMED   |
| 20      | HOUNKPEVI Benoit     | Pharmacien inspecteur à la DPMED                 |
| 21      | CAKPO Corneille      | Pharmacien inspecteur à la DPMED                 |
| 22      | NOUFIONSOU Chantal   | Pharmacien à la DPMED                            |
| 23      | GBAGUIDI Janice      | Pharmacien à la DPMED                            |
| 24      | BOUKARI Rabiétou     | Attaché des services administratifs à la DPMED   |

**Personnes ressources**

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 25 | ONIFADE Al Fattah | Conseiller Pharmaceutique à l'OMS/ Bénin |
| 26 | VISSOH Gilbert    | Spécialiste Santé PCIME, UNICEF /Bénin   |

## Index alphabétique des DCI

- 5 Fluoro-uracile ..... 24, 74  
 Abacavir ..... **17, 18, 67, 68**  
 Acenocoumarol ..... 26  
 Acétazolamide ..... 41, 91  
 Acétylsalicylate de DL-lysine  
 ..... **9, 10, 51, 53**  
 Aciclovir. **18, 40, 66, 68, 89**  
 Acide acetyl salicylique ... 26  
 Acide acétylsalicylique **9, 10,**  
**51, 53**  
 Acide ascorbique..... 45, 95  
 Acide benzoïque + acide  
 salicylique..... 29, 78  
 Acide folique ..... 25, 74  
 Acide gadotérique .... 31, 80  
 Acide ibandronique..... 74  
 Acide méfénamique ..... 54  
 acide mycophénolique .... 24  
 acide N- acetyl aspartyl  
 glutamique..... 41, 89  
 Acide Niflumique ..... **11, 54**  
 Acide pantothénique ..... 96  
 Acide para-aminosalicylique  
 ..... 22  
 Acide salicylique..... 30, 79  
 Acide tranexamique .. 26, 75  
 Acide trichloroacétique.... 97  
 acide zolédronique ... 24, 74  
 Acides aminés..... 96  
 Adenosine triphosphate . 39,  
 89  
 Adipidon de méglumine 31,  
 80  
 adrénaline..... 8, 50, 91  
 Albendazole ..... **20, 59, 60**  
 Alcool ..... 31, 80  
 Alfentanil ..... 53  
 Aliment dietetique..... 96  
 Allopurinol..... **11**  
 Alpha-Tocophérol (Vit E). 46  
 Alprostadil..... 77  
 Ambroxol ..... 44, 93  
 Amidocrysoate de sodium 80  
 Amikacine<sup>A</sup> ..... 63  
 Amiodarone ..... 27, 77  
 Amitriptyline ..... 43, 55, 92  
 Amlodipine .....28  
 Amoxicilline + acide clavulan  
 ique<sup>A</sup>.....60  
 Amoxicilline<sup>A</sup>.....**14, 60**  
 Amphotéricine B .....29, 65  
 Ampicilline<sup>A</sup> .....**14, 61**  
**ANALGESIQUES,**  
**ANTIPYRETIQUES,**  
**ANTIINFLAMMATOIRES**  
 .....**8**  
 Anastrozole .....37  
**ANESTHESIQUES** .....**7, 49**  
**ANTALGIQUES**.....**51**  
 Antiagrégants  
 plaquettaires .....**26**  
 Antiallergiques.....**41, 89**  
**ANTIALLERGIQUES** 11, 55  
 Antianémiques .....**25, 74**  
 Anti-angoreux .....**27**  
 Anti-arythmiques.....**27, 76**  
 Anti-asthmatique.....**44, 93**  
 Anticoagulants .....**25, 75**  
**ANTICONVULSIVANTS**.**13,**  
**58**  
 Antidépresseurs.....**43, 92**  
 Anti-diabétiques .....**85**  
 Antidiarrhéiques .....**84**  
**ANTIDOTES**.....**12, 56**  
 Anti-émétiques .....**33, 82**  
**ANTIEPILEPTIQUES** **13, 58**  
 Antifongiques ..**20, 29, 65,**  
**77**  
 Antihypertenseurs...**27, 76**  
 Anti-infectieux...**29, 78, 89**  
**ANTI-INFECTIEUX** ...**14, 59**  
 Anti-infectueux.....**39**  
 Anti-inflammatoires **10, 30,**  
**40, 53, 54, 78, 90**  
 Antilépreux .....**21, 65**  
**ANTIMIGRAINEUX** ...**22, 72**  
 antimoniate de méglumine  
 .....69  
 Antipaludiques .....**19, 69**  
 Antiparasitaires  
 antihelminthiques .**20, 59**  
**ANTIPARKINSONNIENS** **24**  
 Antiretroviraux..... 17  
 Antirétroviraux..... **66**  
**ANTISEPTIQUES**..... **31, 80**  
**Anti-spasmodiques**. **33, 83**  
 antispastiques ..... **46**  
 Antitoxine diphtérique..... 87  
 Antituberculeux ..... **21, 65**  
 Antitussifs ..... **44**  
**ANTITUSSIFS ET**  
**MUCOREGULATEURS**  
 ..... **93**  
 anti-ulcéreux..... **32, 81**  
 Antivenin de serpent . 38, 87  
 Antiviraux ... **18, 47, 66, 68**  
 Aprépitant ..... 24  
 Artémether ..... **19, 69, 70**  
 Artésunate ..... **19, 70**  
 Articaïne ..... **8**  
 Atazanavir..... **18, 67**  
 Aténolol ..... 27  
 Atorvastatine ..... 28  
 ATPE..... 96  
 Atracurium ..... **7, 50**  
 atropine ..... **12, 41, 57**  
 Atropine ..... 12, 41, 57, 91  
 Azathioprine ..... 24, 46, 99  
 Azithromicine ..... 89  
 Azithromycine<sup>\*WA</sup>..... 63  
 Azithromycine<sup>WA</sup> ..... **16**  
 Baclofène..... 47  
 BCG ..... 88  
 Béclométhasone..... 93  
 Bédaquiline ..... 22  
 Benzalkonium..... 35  
 Benzathine benzylpénicilline  
<sup>A</sup> ..... 61  
 Benzathine-benzyl  
 pénicilline<sup>A</sup> ..... **15**  
 Benzoate de benzyl ..... 30  
 Benzoate de benzyle ..... 79  
 Benzocaïne ..... 33  
 Benzyl pénicilline (Péni G)<sup>A</sup>  
 ..... **15**  
 Benzylpénicilline<sup>A</sup> ..... 61  
 Betaméthasone . **11, 30, 40,**  
**54, 78, 99**



Bicalutamide ..... 23, 37  
 Bicarbonate de sodium .. **45**,  
 94  
 Bisoprolol ..... 28, 77  
 Bléomycine ..... 24, 74  
 Bortézomib ..... 24  
 Budesonide..... 44, 93, 97  
 Bupivacaïne... **8**, **40**, 50, 90  
 Buprenorphine ..... **9**, **52**  
 Butylscopolamine ..... 34  
 Calamine ..... 78  
 Calcium chlorure ..... 94  
 Capecitabine..... 24  
 Captopril..... 27  
 Carbamazépine.. **14**, **58**, **92**  
 Carbimazole ..... 35  
 Carbocistéine..... 44, 93  
 Carboplatine ..... 23, 73  
**cardiotoniques** ..... **28**  
 Carmibazole ..... 86  
 Carraghénanates+ oxyde 33  
 Céfadroxy<sup>A</sup>..... 62  
 Céfalexine<sup>A</sup>..... 62  
 Céfazoline<sup>A</sup>..... **15**  
 Cefixime<sup>WA</sup> ..... 62  
 Céfotaxime<sup>WA</sup>..... **15**, 62  
 Cefpodoxime<sup>WA</sup> ..... 62  
 Ceftazidime<sup>WA</sup> ..... **16**, 62  
 Ceftriaxone<sup>WA</sup> ..... **15**, 62  
 Céfuroxime<sup>A</sup>..... **15**, 62  
 Charbon activé..... **12**, **84**  
 Chlorambucil..... 73  
 Chloramphénicol<sup>A</sup>..... 64  
 chlorhexidine digluconate**31**,  
 80  
 Chlorpromazine..... 42, 92  
 Chlorure de suxamethonium  
 (succinyl choline).... **7**, 50  
 Chlorure de calcium (CaCl)  
 ..... 46  
 Chlorure de magnésium.. 46  
 Chlorure de potassium ... 45,  
 46, 94  
 Chlorure de sodium .. 45, 94  
 Cholécalficérol\* ..... 95  
 ciclosporine..... 24  
 Cimétidine ..... 32

Ciprofloxacine<sup>WA</sup> .40, 97, 98  
 Ciprofloxacine<sup>WA</sup> .....**16**  
 Ciprofloxacine<sup>WA</sup> .....64  
 Cisplatine .....23, 73  
 Citrate de caféine.....98  
 Clarithromycine<sup>WA</sup> .....**16**  
 Clindamycine<sup>WA</sup> .....63  
 Clofazimine .....**21**, **22**, 65  
 Clomipramine .....43, 92  
 Clonazépam .....**14**, 58  
 Clonidine.....27  
 clopidogrel.....26  
 Clorzépatate dipotassique 42  
 Clotrimazole .....**21**, **29**  
 Cloxacilline<sup>A</sup> .....**15**, **61**  
 codéine .....52, 72  
 Colchicine .....**11**  
**CONTRACEPTIFS**....**37**, **38**  
**Corticoïdes** .....**43**, **93**, **97**  
 Cotrimoxazole<sup>A</sup> .....**17**  
 cromoglycate de sodium .41,  
 89  
 Cyanocobalamine (Vit B12)  
 .....46, 96  
 Cyclophosphamide....23, 74  
 Cyclosérine .....22  
 cyproterone .....37, 87  
 Cytarabine.....23, 73  
**CYTOTOXIQUES ET**  
**IMMUNOSUPPRESSEU**  
**RS** .....**73**  
**CYTOTOXIQUES ET**  
**IMMUNOSUPPRESSEU**  
**RS** .....**23**  
 Dantrolène .....**13**, **57**  
 Dapsone .....**21**, 65  
 Darunavir .....**18**, **67**  
 Déféroxamine .....57, 76  
 Desloratadine .....**12**, **56**  
 Desmopressine.....85  
 Dexaméthasone.....**11**, **54**  
 Dexchlorpheniramine.**12**, **56**  
 Dextran .....26, 76  
 Dextrométorphane ....44, 93  
 Diazépam.....**13**, **42**, 58  
 Diclofénac .....**11**, **54**  
 Digoxine .....28, 77

Dihydroartémisinine  
 +piperazine ..... 70  
 Dihydroergotamine ..... 22  
*Dimercaprol* ..... 57  
 Dinitrate d'isosorbide. 27, 28  
 Dinoprostone..... 42  
**DIURETIQUES**..... **32**, **81**  
 Dobutamine ..... 29, 77, 86  
 Docétaxel..... 23, 73  
 Docusate de sodium ..... 55  
 Dolutegravir ..... **18**  
*Domepizole* ..... 57  
 Dopamine ..... 28, 77, 86  
 Dorzolamide..... 41, 91  
 Doxorubicine ..... 23, 73  
 Doxycycline<sup>A</sup> ..... **16**, **64**  
 Drotavérine ..... 34, 83  
 Dydrogestérone..... 37  
 Eau pour préparation  
 injectable ..... 45  
*Edetate de sodium et de*  
*calcium* ..... 58  
 Efavirenz ..... **17**, **18**, 67  
 Eflornithine..... **20**, 71  
 Enalapril ..... 28, 76  
 Enoxaparine sodique 25, 75  
 Enzymes pancréatiques .. 81  
 Eosine aqueuse.. 30, 31, 80  
 Ephedrine ..... **8**, 51  
 Epinéphrine.. 29, 56, 77, 86  
 Epirubicine ..... 24, 74  
 Ergométrine maléate..... 41  
 Ergotamine+caféine ..... 22  
 Erythromycine<sup>WA</sup>..... **16**, **63**  
 Erythropoïétine ..... 25  
 Estradiol ..... 36  
 Estriol ..... 36  
 Ethambutol..... 21, 65  
 Ethinylestradiol..... 37, 38  
*Ethosuximide* ..... 59  
 Etomidate ..... **7**, 50  
 Etoposide..... 23, 73  
 Etravirine ..... **17**  
 Fentanyl..... **10**, **52**  
 Filgrastim ..... 24  
 Flubendazole ..... **20**, **59**  
 Flucloxacilline<sup>A</sup> ..... 15, 61

Fluconazole ..... 21, 29, 66  
 Fludarabine..... 23, 73  
 Fludrocortisone ..... 36, 86  
 Flufénazine décanoate.... 42  
 Fluindione..... 26, 75  
 Flumazénil ..... 13, 57  
 Fluorescéine ..... 30, 79  
 Fluoxétine..... 55  
 Fluoxétine..... 92  
 Flutamide ..... 37  
 Fluticasone ..... 44, 97  
 Formaldéhyde ..... 31  
 Fosofomycine<sup>RE</sup> ..... 64  
 Fraction flavonoïque . 33, 83  
 FSH purifié ..... 35, 85  
 Fumarate de fer..... 25  
 Furosémide..... 32, 81  
 Gabapentine ..... 11, 14  
 Gélatine fluide modifiée  
   isotonique..... 26, 76  
 Gemcitabine ..... 24  
 Gentamicine<sup>A</sup> 16, 40, 63, 89  
 Glimepiride ..... 85  
 Glucagon ..... 85  
**GLUCOCORTICOIDES . 36,**  
   **86**  
 Gluconate de calcium ..... 13  
 Glutaraldéhyde..... 32  
 Gosereline ..... 35  
 Goudron de houille ... 30, 79  
 Griséofulvine..... 20, 66  
 Halopéridol ..... 42, 92  
 Halothane ..... 7, 49  
 Héparine sodique ..... 25  
 Hépéridine ..... 33, 83  
 Hexamidine..... 40, 89  
 Hexétidine ..... 98  
**HORMONES 35, 36, 37, 84,**  
   **85, 87**  
 Hydrochlorothiazide.. 27, 81  
 Hydrocortisone.. 11, 54, 78,  
   86  
 Hydroxocobalamine.. 25, 75  
 Hydroxycarbamide.... 24, 76  
 Hydroxychloroquine.. 46, 99  
 Hydroxyde d'aluminium... 81  
 Hydroxyde d'aluminium +  
   magnésium.....32  
 Hydroxyde de magnésium81  
 Hydroxyéthylamidon..26, 76  
 Hydroxyzine ..... 12, 56, 93  
 hyoscine hydrobromide....55  
 Hypochlorite de sodium ...32  
**hypolipémiants .....28**  
 Ibuprofène....10, 54, 72, 98  
 Imipénème .....16, 63  
 Imipramine .....43  
 Indapamide .....28  
 Indométacine.....10, 40, 90  
 Insuline .....36, 85  
 Interferon .....47, 69  
 Iodine.....31, 95  
 Iodine 38% .....80  
 Iodure de potassium..66, 86  
 Ioxaglate de sodium et de  
   méglumine .....31, 80  
 Ioxitalamate de méglumine  
   .....30, 80  
 Ioxitalamate de sodium...31,  
   80  
 Ipratropium .....43  
 Ipratropium.....93, 97  
 Isoflurane ..... 49, *Voir*  
 Isoniazide.....21, 65  
 Isoprénaline.....13  
 Isoproterenol .....86  
 Ivermectine.....20, 60  
 Kanamycine .....22  
 Kétamine.....7, 49  
 Ketoconazole.....78  
 Ketoprofène.....10  
 Lactate de sodium composé  
   .....45, 95  
 lactulose.....55  
 Lactulose .....34  
 Lamivudine.....17, 18, 67  
 Lamotrigine .....14  
 Lanzoprazole.....33  
 Latanoprost .....41, 91  
 Ledipasvir.....47  
 Leuproreline .....35, 84  
 levocabastine .....41, 90  
 Lévocétirizine .....12, 56  
 Lévodopa + carbidopa..... 25  
 Lévofloxacine ..... 22  
 Levomépromazine ..... 42  
 Levonorgestrel ..... 38  
 lévosulpiride ..... 33, 82  
 Lévothyroxine..... 35, 86  
 Lidocaïne ..... 50  
 Lidocaïne ..... 8, 40, 90  
 Lincomycine<sup>WA</sup> ..... 63  
 Linezolid ..... 22  
 Lisinopril ..... 28  
 Lopéramide ..... 34, 84  
 Lorazépam..... 43, 58, 93  
 Losartan ..... 28  
 Lugol ..... 86  
 Luméfántrine ..... 19  
 Macrogol 4000 ..... 34  
 magnésium ..... 14  
 Mannitol..... 32, 81  
 Mébendazole ..... 20, 59  
 Mécasermine ..... 35, 84  
 Medrogestone ..... 37  
 Médroxyprogestérone .... 38  
 Mélarsoprol ..... 20, 72  
 Melfalan..... 24, 74  
 Menfegol..... 34  
 MEOPA ..... 49  
 Mephénésine ..... 39, 89  
 Mepivacaïne..... 8, 51  
 Mequitazine ..... 12, 56  
 Méropénèm<sup>WA</sup> ..... 62  
 Metformine..... 85  
 Méthadone chlorhydrate . 10,  
   53, 93  
 Méthotrexate 23, 46, 74, 99  
 Métyldopa ..... 27  
 Methylprednisolone..... 55  
 Métoclopramide..... 33, 82  
 Métopimazine..... 33, 82  
 Métronidazole<sup>A</sup>.. 17, 19, 64,  
   69  
 Miconazole... 21, 29, 66, 78  
 Midazolam ..... 7, 13, 49  
 Misoprostol ..... 42  
 Mometazone ..... 44, 97  
 Monalazone disodique .... 34  
 Morphine chlorhydrate 9, 52

|   |                   |   |                   |                             |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| moxifloxacine .....                       | 22                | Oxytocine .....                         | 41                | Rabéprazole.....            | 33                |
| <b>Mucorégulateurs</b> .....              | <b>44</b>         | Paclitaxel .....                        | 23, 73            | Raltégravir .....           | <b>18, 68</b>     |
| Multivitamine.....                        | 45, 96            | Pamidronate de sodium...24              |                   | Ranitidine.....             | 32, 82            |
| Mupirocine.....                           | 78                | Pancuronium .....                       | 7, 50             | Remifentanyl.....           | <b>10, 53</b>     |
| <b>MYORELAXANTS</b> ...                   | <b>39, 89</b>     | Paracétamol ..9, 10, 51, 52,            | 72                | Résine de podophylle.....   | 79                |
| <b>N-Acétylcystéine</b> <b>13, 44, 57</b> |                   | Paracetaamol .....                      | 72                | ReSoMal.....                | 96                |
| Naftidrofuryl .....                       | 29                | Paraffine .....                         | 34                | Rétinol.....                | 45, 95            |
| Nalbuphine .....                          | <b>9, 52</b>      | paroxétine .....                        | 43                | Ribavirine.....             | <b>18, 47, 68</b> |
| Naloxone .....                            | <b>13, 57</b>     | Pentamidine .....                       | <b>20, 71</b>     | Riboflavine .....           | 95                |
| Néfopam.....                              | <b>9</b>          | Périndopril.....                        | 28                | Rifampicine .....           | <b>21, 22, 65</b> |
| Néomycine .....                           | 29, 40, 90        | Permanganate de potassium               | ..... 31, 78      | Rifamycine .....            | 39                |
| Neostygmine.....                          | <b>13, 57</b>     | Perméthrine.....                        | 30, 79            | Rispéridone.....            | 42, 92            |
| Netilmicine <sup>A</sup> .....            | <b>16, 63</b>     | Péroxyde de benzoyle ....               | 79                | Ritonavir .....             | <b>17, 18, 67</b> |
| <b>Neuroleptiques</b> .....               | <b>42</b>         | Phénobarbital .....                     | <b>13, 59</b>     | Rivaroxaban .....           | 26                |
| Névirapine .....                          | <b>17, 67</b>     | Phénoxyméthylpénicilline                |                   | Ropivacaïne .....           | <b>8, 51</b>      |
| Nicardipine .....                         | 28                | (PéniV) <sup>A</sup> .....              | <b>15, 61</b>     | rt-PA ( Altéplase) .....    | 26                |
| Niclosamide .....                         | <b>20</b>         | phényléphrine.....                      | 41, 91            | Saccharomyces.....          | 84                |
| Nifédipine .....                          | 27                | Phloroglucinol.....                     | 34                | Salbutamol.....             | 42, 44, 94        |
| Nilutamide .....                          | 37                | Phytoménadione .....                    | 26                | <b>Scabicides</b> .....     | <b>30, 79</b>     |
| nitrate d'argent.....                     | 97                | Pilocarpine .....                       | 41, 90            | Secnidazole .....           | <b>19, 69</b>     |
| Nitrofurantoïne <sup>A</sup> .....        | <b>17</b>         | Piribédil.....                          | 25                | Sels de réhydratation orale |                   |
| Nomegestrol .....                         | 37                | Pizotifène .....                        | 22                | .....                       | 83                |
| Nonoxynol-9 .....                         | 34                | Povidone iodée ...31, 81, 98            |                   | Sels ferreux.....           | 75                |
| Noradrenaline .....                       | 36                | Praziquantel .....                      | <b>20, 60</b>     | <b>Sels minéraux</b> .....  | <b>46</b>         |
| Noréthistérone .....                      | 38                | Prednisolone <b>11, 40, 54, 90</b>      |                   | Sérum antirabiques.....     | 87                |
| Nystatine .....                           | <b>21, 66, 98</b> | Prednisone .....                        | 54                | sérum anti D.....           | 38                |
| <b>OCYTOCIQUES ET ANTI-</b>               |                   | Prégabaline .....                       | <b>11</b>         | Sérum antirabique .....     | 38                |
| <b>OCYTOCIQUES</b> .....                  | <b>41</b>         | Procaïne-benzylpénicilline <sup>A</sup> |                   | Sérum antitétanique.....    | 38                |
| oestradiol.....                           | 87                | .....                                   | <b>15, 61</b>     | Sérum antivénimeux .....    | 38                |
| Ofloxacine <sup>WA</sup> .....            | 22                | Procarbazine .....                      | 23, 73            | Serum bicarbonaté ...       | 45, 94            |
| Ofloxacine <sup>WA</sup> .....            | <b>16</b>         | <b>PRODUITS A USAGE</b>                 |                   | Serum glucosé .....         | 45, 94            |
| Ofloxacine <sup>WA</sup> .....            | 89                | <b>DIAGNOSTIQUE</b> .....               | <b>30</b>         | Serum physiologique         | 43, 97            |
| Ofloxacine <sup>WA</sup> .....            | 97                | Progesterone.....                       | 37, 38            | Serum Salé .....            | 45, 94            |
| Oligoéléments .....                       | 96                | Promegestone .....                      | 37                | <b>Sérums et</b>            |                   |
| Oméprazole .....                          | 32, 82            | Prométhazine .....                      | <b>12, 55, 93</b> | <b>immunoglobulines</b> ... | <b>38,</b>        |
| ondansétron.....                          | 55                | Propofol .....                          | <b>7, 49</b>      | <b>87</b>                   |                   |
| Ondansétron .....                         | 24, 82            | Propranolol.....                        | 22, 27, 76        | Sevoflurane.....            | <b>7, 49</b>      |
| Ornidazole .....                          | <b>19</b>         | Prostaglandine.....                     | 77, 98            | Simvastatine .....          | 28                |
| Oseltamivir .....                         | 68                | Prothionamide .....                     | 22                | Sofosbuvir.....             | 47                |
| Oxacilline <sup>A</sup> .....             | <b>15, 62</b>     | <b>PSYCHOTROPES</b> ....                | <b>42, 92</b>     | Solution DPCA .....         | 91                |
| Oxaliplatine.....                         | 23, 73            | Pyrantel .....                          | <b>20, 59</b>     | Somatropine.....            | 35, 85            |
| Oxamniquine.....                          | <b>20, 60</b>     | Pyrazinamide.....                       | 21, 22, 65        | <b>SPERMICIDES</b> .....    | <b>34</b>         |
| Oxybuprocaine.....                        | 40, 90            | Pyridoxine .....                        | 45, 95            | Spiramycine .....           | 71                |
| oxygène .....                             | 49                | Pyriméthamine.....                      | 70                | Spironolactone .....        | 32, 81            |
| Oxygène.....                              | <b>7, 49</b>      | Quinine .....                           | <b>19, 70</b>     | SRO .....                   | 34, 44, 94        |
| Oxymetazoline .....                       | 43, 97            |   |                   | Streptokinase .....         | 26                |
| Oxytétracycline .....                     | 40, 90            |   |                   |                             |                   |

## SUCCEDANES DU SANG

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| .....                            | <b>26</b>             |
| <i>Succimer</i> .....            | 58                    |
| Sufentanil .....                 | <b>10, 52</b>         |
| Sulfadiazine .....               | 71, 78                |
| Sulfadoxine.....                 | 19, 70                |
| sulfaméthoxazole .....           | 64                    |
| Sulfaméthoxazole.....            | 71                    |
| Sulfasalazine .....              | 46, 99                |
| Sulfate de baryum ....           | 30, 80                |
| Sulfate de protamine.            | 26, 75                |
| Sumatriptan .....                | 22, 72                |
| Suramine sodique .....           | <b>20</b>             |
| Suramine sodique* .....          | 71                    |
| surfactant .....                 | 98                    |
| Tacrolimus.....                  | 24                    |
| Tamoxifène.....                  | 36                    |
| Ténofovir .....                  | <b>17, 18, 47, 68</b> |
| Terbinafine .....                | 78                    |
| Terbutaline .....                | 44, 94                |
| Testosterone.....                | 37, 87                |
| Tétracaïne .....                 | 40, 90, 98            |
| Tétracycline .....               | 16, 39, 89            |
| Tétracycline <sup>A</sup> .....  | <b>16</b>             |
| Thalidomide .....                | 24                    |
| Thiamazole.....                  | 35, 86                |
| Thiamine .....                   | 95                    |
| Thiamphénicol <sup>A</sup> ..... | 64                    |
| Thiocolchicoside.....            | 39, 89                |
| Thiopental sodique .....         | <b>7, 49</b>          |
| Thiouracile.....                 | 35, 86                |
| Tiamphénicol <sup>A</sup> .....  | <b>16</b>             |

|  |                |
|--|----------------|
| Tiapride.....                                    | 42             |
| Tiemonium .....                                  | 34             |
| Tiliquinol/ Tilbroquinol.....                    | <b>19</b>      |
| Timolol.....                                     | 41, 91         |
| Tinidazole.....                                  | <b>19, 69</b>  |
| Tixocortol Pivalat.....                          | 97             |
| Tobramycine.....                                 | 40, 90         |
| <b>Tonicardiaques</b> .....                      | <b>77</b>      |
| Toxine botulinique .....                         | 46             |
| Tramadol.....                                    | <b>9, 52</b>   |
| Trastuzumab .....                                | 24             |
| Triamcinolone .....                              | 44, 97, 99     |
| Trihexyphénidyle.....                            | 25, 43         |
| Trinitrate de glycérol.....                      | 27             |
| Triptoreline .....                               | 35, 84         |
| Tropatépine .....                                | 25, 43         |
| Tropicamide .                                    | 30, 41, 79, 91 |
| Tuberculine .....                                | 87             |
| Urée .....                                       | 79             |
| Vaccin anti pneumococcique .....                 | 39             |
| Vaccin anti rougeole et anti rubéole (R R )..... | 88             |
| Vaccin anti- <i>hépatite B</i> .....             | 39             |
| vaccin antiméningococcique .....                 | 39, 88         |
| Vaccin antipneumococcique (PCV13).....           | 88             |
| Vaccin antipoliomyélitique orale (VPO) .....     | 88             |
| Vaccin antirabique.....                          | 88             |
| Vaccin antirotavirus.....                        | 88             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| vaccin antitétanique .....                      | 88                    |
| Vaccin antitétanique.....                       | 39                    |
| Vaccin monovalent anti- <i>hépatite B</i> ..... | 88                    |
| Vaccin pentavalent .....                        | 88                    |
| Vaccin poliomyélitique inactifé.....            | 88                    |
| Vaccin rabique Humain inactifé .....            | 39                    |
| <b>Vaccins</b> .....                            | 38, 88                |
| valproate de sodium..                           | <b>13, 58</b>         |
| vancomycine <sup>WA</sup> .....                 | 64                    |
| <b>Vasoconstricteurs</b> ..                     | <b>43, 97</b>         |
| <b>Vasodilatateur</b> .....                     | <b>29</b>             |
| Vecuronium.....                                 | <b>8, 50</b>          |
| Velpatasvir .....                               | 47                    |
| Vérapamil .....                                 | 28                    |
| Vincristine .....                               | 23, 73                |
| Vinorelbine.....                                | 23, 73                |
| Violet de gentiane .....                        | 29                    |
| Vitamine B complex ..                           | 46, 96                |
| Vitamine K1 .                                   | <b>13, 26, 57, 75</b> |
| Vitamines.....                                  | 45, 96                |
| <b>VITAMINES ET SELS</b>                        |                       |
| <b>MINERAUX</b> .....                           | <b>45</b>             |
| Voriconazole .....                              | <b>21</b>             |
| Warfarine .....                                 | 75                    |
| Xylène .....                                    | 97                    |
| Xylométazoline .....                            | 97                    |
| Zidovudine .....                                | <b>17, 18, 67</b>     |
| Zinc .....                                      | 34, 44, 84, 94        |

## LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX ESSENTIELS

| ANESTHESIE- SOINS INTENSIFS |   |
|-----------------------------|---|
| 1                           | Aspirateur électrique de mucosité adulte  |
| 2                           | Pompe à perfusion   |
| 3                           | Table de réanimation néonatale  |
| 4                           | Aspirateur de mucosités à pédale  |
| 5                           | Masques Faciaux à oxygène à forte concentration nouveau-né tailles 0              |
| 6                           | Masques faciaux à oxygène à forte concentration nourrisson tailles 1,             |
| 7                           | Masques faciaux à oxygène à forte concentration enfant tailles 2,                 |
| 8                           | Masques faciaux à oxygène à forte concentration adolescent tailles 3              |
| 9                           | Masques faciaux à oxygène à forte concentration adulte tailles 4                  |
| 10                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°6,                          |
| 11                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N° 8,                         |
| 12                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°10                          |
| 13                          | Sonde d'alimentation pédiatrique CH 10-40 CM UU Unité                             |
| 14                          | Sonde d'alimentation pédiatrique CH 6-40 CM UU Unité                              |
| 15                          | Sonde d'alimentation pédiatrique CH 8-40 CM UU Unité                              |
| 16                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°12,                         |
| 17                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°14,                         |
| 18                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°16,                         |
| 19                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°18,                         |
| 20                          | Sonde d'aspiration trachéale avec valve de contrôle N°20,                         |
| 21                          | sonde gastrique 12FR  |
| 22                          | sonde gastrique 6FR   |
| 23                          | sonde gastrique 8FR   |
| 24                          | sonde gastrique CH 10-40 CM UU Unité  |
| 25                          | sonde gastrique en PVC avec embout de connexion) la tubulure de poche CH 12 Unité |
| 26                          | sonde gastrique en PVC avec embout de connexion) la tubulure de poche CH 14 Unité |

|    |   |
|----|---|
| 27 | sonde gastrique en PVC avec embout de connexion) la tubulure de poche CH 16 Unité |
| 28 | sonde gastrique en PVC avec embout de connexion) la tubulure de poche CH 18 Unité |
| 29 | Sonde urinaire femelle FD 16  |
| 30 | Sonde urinaire vésicale Nélaton modèle homme CH 10-40 CM UU Unité                 |
| 31 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 30 ml CH16 UU Unité                |
| 32 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 30 ml CH18 UU Unité                |
| 33 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 30 ml CH18 UU Unité                |
| 34 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 30 ml CH20 UU Unité                |
| 35 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 30 ml CH22 UU Unité                |
| 36 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 10 ml CH10 UU Unité                |
| 37 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 10 ml CH12 UU Unité                |
| 38 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 10 ml CH14 UU Unité                |
| 39 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 10 ml CH16 UU Unité                |
| 40 | Sonde vésicale de foley 2 voies avec ballonnet 10 ml CH18 UU Unité                |
| 41 | Sonde vésicale de foley 2 voies CH 24 UU Unité                                    |
| 42 | Sondes d'intubation   |
| 43 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 3.0 MM-Unité             |
| 44 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 3.5 MM-Unité             |
| 45 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 4.0 MM-Unité             |
| 46 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 4.5 MM-Unité             |
| 47 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 5.0 MM-Unité             |
| 48 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 6.0 MM-Unité             |
| 49 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 6.5 MM-Unité             |
| 50 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 7.0 MM-Unité             |
| 51 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 7.5 MM-Unité             |
| 52 | Sondes d'intubation endotrachéales avec ballonnet en PVC 8.0 MM-Unité             |
| 53 | Aspirateur manuel   |
| 54 | Sonde naso gastrique (diamètre 7 à 12)  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 55                            | Laryngoscopes enfant                             |
| 56                            | Laryngoscopes adulte                             |
| 57                            | Appareil de photothérapie,                       |
| 58                            | Défibrillateur                                   |
| 59                            | Incubateur Nouveau-né                            |
| 60                            | Insufflateur manuel adulte,                      |
| 61                            | Insufflateur, manuel, enfant                     |
| 62                            | Insufflateur, manuel, nouveau-né                 |
| 63                            | Pousse-seringue                                  |
| 64                            | Ventilateur de réanimation, adulte               |
| 65                            | Ventilateur de réanimation, enfant (CPAP)        |
| <b>BANDAGES ET PANSEMENTS</b> |  |
| 66                            | Compresse stérile                                |
| 67                            | gaze stérile, usage unique                       |
| 68                            | Compresse non stérile, usage unique              |
| 69                            | gaze, non stérile, usage unique                  |
| 70                            | coton, rouleau, non stérile                      |
| 71                            | Ruban adhésif médical                            |
| 72                            | Bracelet d'identification du nouveau-né          |
| 73                            | Bande élastique non adhésive 10CM X 5 M Rouleau  |
| 74                            | Bande élastique non adhésive 7,5CM X 4 M Rouleau |
| 75                            | Bande gaze non stérile 10CM X 5M rouleau         |
| 76                            | Bande gaze non stérile 5CM X 5M rouleau          |
| 77                            | Bande gaze non stérile 7,5CM X 5M rouleau        |
| 78                            | Coton cardé 500G rouleau                         |
| 79                            | Coton hydrophile 100G PQT (COTODEX)              |
| 80                            | Coton hydrophile 100G PQT (MEG)                  |
| 81                            | Coton hydrophile 500 G rouleau                   |

| BLOC OPERATOIRE |  |
|-----------------|--|
| 82              | Table d'anesthésie   |
| 83              | Lampe opératoire fixe  |
| 84              | Bistouri électrique  |
| 85              | Lampe opératoire mobile  |
| 86              | Aspirateur chirurgical   |
| 87              | sondes endotrachéales  |
| 88              | Appareil de cryochirurgie  |
| 89              | Laryngoscope nouveau-né  |
| 90              | Fil de suture 90 CM DEC 2 24 MM 3/8 C (ETHYLON NOIR N°3/0)                           |
| 91              | Fil de suture 90 CM DEC 3 26 MM 3/8 C (ETHYLON NOIR N°2/0)                           |
| 92              | Fil de suture 90 CM DEC 5 40 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°2)                      |
| 93              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 2 22 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°3/0)     |
| 94              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 2 22 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°3/0)     |
| 95              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 3 22 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°2/0)     |
| 96              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 3 30 MM 1/2 C triangulaire MERS 2/0           |
| 97              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 4 26 MM 1/2 C triangulaire MERS N°1           |
| 98              | Fil de suture non résorbable 75 CM DEC 6 36 MM 1/2 C triangulaire MERS N°3           |
| 99              | Fil de suture non résorbable 90 CM DEC 4 3/8 C triangulaire serti (ETHYLON NOIR N°1) |
| 100             | Fil de suture non résorbable 90 CM DEC 4 3/8 C triangulaire serti (ETHYLON BLEU N°1) |
| 101             | Fil de suture résorbable 75 CM DEC 3 26 MM 1/2 C ronde (VICRYL 2/0)                  |
| 102             | Fil de suture résorbable 90 CM DEC 3,5 36 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°0)         |
| 103             | Fil de suture résorbable 90 CM DEC 4 40 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°1)           |
| 104             | Fil de suture résorbable 90 CM DEC 5 40 MM 1/2 C triangulaire (VICRYL N°2)           |
| 105             | Gants chirurgie taille 7 latex paire   |
| 106             | Gants chirurgie taille 7,5 latex paire   |
| 107             | Gants chirurgie taille 8 latex paire   |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 108                           | Gants chirurgie taille 8,5 latex paire                   |
| 109                           | Gants examen non stérile taille grande latex bte de 100  |
| 110                           | Gants examen non stérile taille moyenne latex bte de 100 |
| 111                           | Pince à cordon ombilical                                 |
| <b>CONSULTATION</b>           |  |
| 112                           | Tensiomètre  |
| 113                           | Stéthoscope médical                                      |
| 114                           | Stéthoscope obstétrical                                  |
| 115                           | Marteau réflexe  |
| 116                           | Pèse personne  |
| 117                           | Toise Bébé   |
| 118                           | Pèse bébé  |
| 119                           | Lampe d'examen   |
| 120                           | Thermomètre médical                                      |
| 121                           | Pelvimètres  |
| 122                           | Mètre-ruban  |
| 123                           | Marteau réflexe pédiatrique                              |
| 124                           | Stéthoscope nourrisson                                   |
| 125                           | Otoscope + spéculum pour nouveau-né                      |
| 126                           | Tensiomètre pédiatrique                                  |
| 127                           | Stéthoscope pédiatrique                                  |
| 128                           | Otoscope   |
| 129                           | Ophtalmoscope  |
| 130                           | Pèse bébé suspension                                     |
| 131                           | Abaisse - langue, bois, usage unique                     |
| <b>DISPOSITIF D'INJECTION</b> |  |
| 132                           | Panier   |
| 133                           | Seringues capacités (5ml)                                |

|     |   |
|-----|---|
| 134 | Seringues capacités (10ml)                                  |
| 135 | Boite de sécurité pour seringues/ aiguilles usagés          |
| 136 | Cathéter veineux périphérique taille 14                     |
| 137 | Cathéter veineux périphérique taille 16                     |
| 138 | Cathéter veineux périphérique taille 18                     |
| 139 | Cathéter veineux périphérique taille 20                     |
| 140 | Cathéter veineux périphérique taille 22                     |
| 141 | Cathéter veineux périphérique taille 24                     |
| 142 | Cathéter veineux central adulte 2 voies G16                 |
| 143 | Cathéter veineux central pédiatrique 2 voies G22            |
| 144 | Perfuseur   |
| 145 | Garrot  |
| 146 | Vaccinostyle stérile  |
| 147 | Seringues autobloquantes                                    |
| 148 | Aiguille, LUER, 25G (0,5 x 16mm), stérile                   |
| 149 | Aiguille, LUER 23G (0,6 x 25mm), stérile, usage             |
| 150 | Aiguille, LUER 22G (0,6 x 25mm), stérile, usage             |
| 151 | Seringue insuline + aiguille 1 ml (LUER)                    |
| 152 | Aiguille, LUER, 21G (0,8 x 40mm), stérile                   |
| 153 | Aiguille, LUER, 19G (1,1 x 40mm), stérile, usage            |
| 154 | Aiguille, veine épicroânienne, 25G                          |
| 155 | Aiguille, veine épicroânienne, 21G                          |
| 156 | Aiguille spinale 22G (0,5 x 90mm),                          |
| 157 | Aiguille spinale pour ponction lombaire 19G 1(0,5 x 90mm) ? |
| 158 | Aiguille spinale pour ponction lombaire 19G 3(0,5 x 90mm) ? |
| 159 | Aiguille spinale pour ponction lombaire 22G (0,5 x 90mm),   |
| 160 | Aiguille spinale pour ponction lombaire 25G (0,5 x 90mm),   |
| 161 | Seringues capacités (20ml)                                  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 162                      | Seringues capacités (50ml)                               |
| <b>DM DE FROID</b>       |  |
| 163                      | Réfrigérateur électrique                                 |
| 164                      | Congélateur électrique                                   |
| 165                      | Caisse isotherme (Grand modèle)                          |
| 166                      | Caisse isotherme (Petit modèle)                          |
| 167                      | Accumulateur de froid                                    |
| 168                      | réfrigérateur-congélateur médical                        |
| 169                      | Réfrigérateur mixte                                      |
| <b>DM A USAGE UNIQUE</b> |  |
| 170                      | Lancette stérile   |
| 171                      | Ecouvillon stérile                                       |
| 172                      | Collecteur d'urine                                       |
| 173                      | Sutures, synthétiques, résorbable;                       |
| 174                      | Sutures, synthétiques, non résorbable                    |
| 175                      | Canule de Guedel, translucide, taille 0                  |
| 176                      | Canule de Guedel, translucide, taille 1                  |
| 177                      | Canule de Guedel, translucide, taille 2                  |
| 178                      | Canule de Guedel, translucide, taille 3                  |
| 179                      | Canule de Guedel, translucide, taille 4                  |
| 180                      | Canule endotrachéale sans ballonnet                      |
| 181                      | Canule endotrachéale avec ballonnet                      |
| 182                      | Gants examen non stérile taille grande latex bte de 100  |
| 183                      | Gants examen non stérile taille moyenne latex bte de 100 |
| 184                      | Gants examen non stérile taille petite latex bte de 100  |
| 185                      | Gants obstétrique taille 7,5 latex paire                 |
| 186                      | Kit pour test de diagnostic rapide (TDR) VIH             |
| 187                      | Lame bistouri chirurgie N°10 bte de 100                  |

|     |   |
|-----|---|
| 188 | Lame bistouri chirurgie N°22 bte de 100             |
| 189 | Lame bistouri chirurgie N°22 pqt de 5               |
| 190 | Lame bistouri chirurgie N°23 bte de 100             |
| 191 | Lame bistouri chirurgie N°24 bte de 100             |
| 192 | Poche à urine pédiatrique + vidange (URINOCOL)      |
| 193 | Poche collecteur urine avec vidange 2L              |
|     | <b>EXPLORATION FONCTIONNELLE ET SURVEILLANCE</b>    |
| 194 | Amnioscope  |
| 195 | Moniteur/doppler fœtal                              |
| 196 | Oxymètre de pouls                                   |
| 197 | moniteur multiparamétrique                          |
| 198 | Cardiotocographe                                    |
| 199 | Chronomètre   |
| 200 | Moniteur d'apnée                                    |
| 201 | Colposcope  |
| 202 | <b>Gaz</b>  |
| 203 | Obus d'oxygène + Humidificateur + Masque + Lunettes |
| 204 | Manodétendeur                                       |
|     | <b>IMAGERIE MEDICALE</b>                            |
| 205 | Echographe  |
| 206 | Sonde Echographique Linéaire                        |
| 207 | Sonde Echographique Convexe                         |
| 208 | Sonde Echographique Cavitaire                       |
| 209 | Appareil de radiographie                            |
| 210 | Négatoscope   |
| 211 | Mammographe   |
|     | <b>INSTRUMENTATION MEDICALE</b>                     |
| 212 | Plateau rectangulaire                               |

MB

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 213                     | Plateau à instruments            |
| 214                     | Plateau réniforme                |
| 215                     | Pince à servir                   |
| 216                     | Porte pince à servir             |
| 217                     | Plateau de délivrance            |
| 218                     | Boite d'hystérectomie            |
| 219                     | Boite d'accouchement             |
| 220                     | Boite de curetage                |
| 221                     | Boite d'AMIU                     |
| 222                     | Kit d'AMIU                       |
| 223                     | Boite d'épisiotomie              |
| 224                     | Boite pour dilateur de Hégar     |
| 225                     | Boite d'examen sous valve        |
| 226                     | Boite de GEU                     |
| 227                     | Boite de césarienne              |
| 228                     | Boite Cerclage du Col Utérin     |
| 229                     | Tambour                          |
| 230                     | Boite de pansement               |
| 231                     | Boîte à spéculum                 |
| 232                     | Boîte de petite chirurgie        |
| 233                     | Boîte DIU (insertion et retrait) |
| <b>MOBILIER MEDICAL</b> |                                  |
| 234                     | Table d'examen                   |
| 235                     | Table d'examen gynécologique     |
| 236                     | Fauteuil roulant                 |
| 237                     | Chariot de soins                 |
| 238                     | Lit+ matelas                     |
| 239                     | Table d'opération                |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 240                      | Table de mayo                               |
| 241                      | Table d'accouchement                        |
| 242                      | Berceau                                     |
| 243                      | Table d'examen pédiatrique                  |
| 244                      | Table à langer                              |
| 245                      | Berceau à coque                             |
| 246                      | Poubelle métallique à couvercle et à pédale |
| 247                      | Toise                                       |
| 248                      | fauteuil de prélèvement                     |
| 249                      | Escabeau                                    |
| 250                      | Potence+ panier                             |
| 251                      | lavabo aseptique                            |
| 252                      | Table de pansement à trou                   |
| 253                      | Armoire, instruments                        |
| 254                      | Armoire à pharmacie                         |
| 255                      | Chariot brancard                            |
| <b>PLANNING FAMILIAL</b> |   |
| 256                      | Condom masculin                             |
| 257                      | DIU   |
| 258                      | Crochet de retrait DIU                      |
| 259                      | Diaphragme vaginal                          |
| 260                      | Collier du cycle                            |
| 261                      | Condom féminin                              |
| <b>STERILISATION</b>     |   |
| 262                      | Bac à déchets                               |
| 263                      | Bac de décontamination                      |
| 264                      | Four pour stérilisation                     |
| 265                      | Autoclave de capacité moyenne               |

AB

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 266  | Autoclave de grande capacité     |
| 267  | Autoclave de paillasse           |
| <b>THERAPIE ET REEDUCATION FONCTIONNELLE</b> |                                  |
| 268  | Concentrateur d'oxygène          |
| 269  | Ventouse obstétricale électrique |
| 270  | Ventouse obstétricale manuelle   |
| 271  | Table de photothérapie           |
| 272  | Sonde urinaire                   |
| 273  | Nébuliseur, avec accessoires     |
| 274  | Matelas chauffant                |
| 275  | Sonde de Foley CH08, stérile     |
| 276  | Sonde de Foley, CH10, stérile    |
| 277  | Sonde de Foley, CH12, stérile    |
| 278  | Sonde de Foley, CH14, stérile    |
| 279  | Sonde urétrale CH12 stérile      |
| 280  | Sonde urétrale CH14 stérile      |
| <b>USTENSILE MEDICAL</b>                     |                                  |
| 281  | Bassins réniformes               |
| 282  | Bocal pour Pince à servir        |
| 283  | Cuvette                          |
| 284  | Pissette 125ml                   |
| 285  | Pissette 250ml                   |
| 286  | Pissette 500 ml                  |
| 287  | Pissette 1000 ml                 |
| 288  | Polythène 500ml                  |
| 289  | Brosse pour lavage des mains     |
| <b>MATERIEL DE PRELEVEMENT</b>               |                                  |
| 290  | Ecouvillon-coton                 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 291                            | Compresse de gaze,                                       |
| 292                            | Compresse de gaze,                                       |
| 293                            | Compresse de gaze,                                       |
| 294                            | Compresse de gaze,                                       |
| 295                            | Compresse de gaze,                                       |
| 296                            | Compresse de gaze,                                       |
| 297                            | Seringues graduées hypodermique +aiguille                |
| 298                            | Bande ou tube de caoutchouc pour garrot                  |
| 299                            | Aiguilles  |
| <b>APPAREIL DE LABORATOIRE</b> |  |
| 300                            | Automates de Biochimie                                   |
| 301                            | Automate pour préparation de milieux de culture          |
| 302                            | Automates d'hématologie multi paramètres (5 populations) |
| 303                            | Automates d'hématologie multi paramètres (3 populations) |
| 304                            | Analyseur gaz du sang                                    |
| 305                            | Chaîne d'électrophorèse des protéines                    |
| 306                            | Chaine Elisa (lecteur et laveur)                         |
| 307                            | Hémoglobinomètre   |
| 308                            | Microscope optique                                       |
| 309                            | Appareil pour CD4+                                       |
| 310                            | pH-mètre   |
| 311                            | Agitateur Vortex   |
| 312                            | Agitateur Kline  |
| 313                            | Banque de sang   |
| 314                            | Incubateurs  |
| 315                            | Hottes biologiques                                       |
| 316                            | réfrigérateur de laboratoire                             |
| 317                            | tube sous vide   |

MB



|     |  |
|-----|--|
| 318 | Tubulure                                     |
| 319 | Transfuseur                                  |
| 320 | Kit pour test de diagnostic rapide (TDR) VIH |
| 321 | Microscope binoculaire                       |
| 322 | Balance de précision                         |
| 323 | Automates de sérologie                       |
| 324 | Pot de prélèvement                           |
| 325 | Kit pour TDR syphilis                        |
| 326 | Minuterie compteur et décompteur             |
| 327 | Distillateur d'eau                           |
| 328 | Thermomètre de laboratoire                   |
| 329 | Micropipettes de différentes tailles         |
| 330 | Bain Marie                                   |
| 331 | Spectrophotomètre                            |
| 332 | Centrifugeuse de paillasse                   |
| 333 | Bec Bunsen avec veilleuse                    |
| 334 | Portoir plexiglas pour 30 tubes de 14ml      |
| 335 | Portoir de 24 trous pour tubes à hémolyse    |
| 336 | Portoir de 12 trous pour tubes à essai       |
| 337 | Porte lame                                   |
| 338 | Râtelier                                     |
| 339 | Fil de platine droite de 100                 |
| 340 | Pince clamp pour tubes en caoutchouc         |
| 341 | plaque d'opaline Poire                       |
| 342 | Pince pour tubes en bois (GM)                |
| 343 | Pince pour tubes en bois (PM)                |
| 344 | Spatule polyéthylène                         |
| 345 | Kit de prélèvement vaginal                   |

|     |  |
|-----|--|
| 346 | Analyseur de gaz de sang                 |
| 347 | Chaîne d'électrophorèse de l'hémoglobine |
| 348 | pH-mètre                                 |
| 349 | Etuve bactériologique                    |
| 350 | Hotte à flux laminaire                   |
| 351 | Bain-marie thermostaté                   |
| 352 | Tube à hémolyse                          |
| 353 | Tube à essai                             |
| 354 | Eprouvette graduée                       |
| 355 | lecteur d'hématocrite                    |
| 356 | Hémoleucomètre                           |
| 357 | Balance de précision                     |
| 358 | Appareils d'hémostase (coagulomètre)     |
| 359 | Bilirubinomètre                          |
| 360 | Cellule de Malassez                      |
| 361 | Centrifugeuse électrique                 |
| 362 | Migrateur                                |
| 363 | Applicateur                              |
| 364 | Générateur d'électrophorèse              |
| 365 | Bande d'électrophorèse                   |
| 366 | milieu de culture                        |
| 367 | Milieu d'identification                  |
| 368 | Disque d'antibiotique                    |
| 369 | Plaque chauffante                        |
| 370 | Erlenmeyer                               |
| 371 | Tubes citrate                            |
| 372 | Tube EDTA                                |
| 373 | Tube Gel                                 |

|     |               |
|-----|---------------|
| 374 | Tube fluoré   |
| 375 | Tube NAF      |
| 376 | Tube hépariné |
| 377 | Cône bleu     |
| 378 | Cône jaune    |

MB

## LISTES DES REACTIFS ET SUBSTANCES DE REFERENCE

| REACTIFS D'ANALYSE BIOMEDICALE |  |
|--------------------------------|--|
| 1                              | Serodia-hcv  |
| 2                              | Serodia-hbs  |
| 3                              | Serodia-tp. Pa   |
| 4                              | Hivelisa kit (jaj)   |
| 5                              | Murex hbs  |
| 6                              | Immunocomb ii hbs ag   |
| 7                              | Immunocomb ii hiv1 et 2 bispot   |
| 8                              | Immunocomb ii hcv  |
| 9                              | Ortho hcv 3.0 elisa test   |
| 10                             | Ortho hiv1/hiv2 ab-capture elisa test system   |
| 11                             | Capillus hiv1-hiv2 (trinity biotech)   |
| 12                             | Rpr carbon( sorachim)  |
| 13                             | Mediscreenurinbandelette   |
| 14                             | Oreahcg stick  |
| 15                             | Milieu chapman agar (sharlau)  |
| 16                             | Milieu cled agar (sharlau)   |
| 17                             | Milieu muellerhinton agar (sharlau)  |
| 18                             | Milieu emb agar (sharlau)  |
| 19                             | Genscreen hivversion 2 ag-ac   |
| 20                             | Genscreen ultrahivag-ab  |
| 21                             | Monolisa anti hcv plus version 2   |
| 22                             | Immutreptpha   |
| 23                             | Virotechhbs ag   |
| 24                             | Monolisa ag hbs ultra  |
| 25                             | Geni ii hiv1-hiv2  |
| 26                             | Test rapide d'agglutination pour le diagnostic des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (biorad) |
| 27                             | Transclone anti-a, anti-b, anti-ab, anti-d   |
| 28                             | Reactifs cd4, cd3, cd8 (cytecs)  |
| 29                             | Vironostikahiv uniform ii ag/ab  |
| 30                             | Avitexcrp  |
| 31                             | Enzygnosthiv integral ii   |
| 32                             | Determine hiv1-hiv2  |

|    |  |
|----|--|
| 33 | Axsymhivag/ab combo                                      |
| 34 | Determine hbs  |
| 35 | Determine syphilis                                       |
| 36 | Axsymhbs   |
| 37 | Axsymhcv   |
| 38 | Seracloneanti-a  |
| 39 | Seracloneanti-b  |
| 40 | Seraclone anti-ab  |
| 41 | Seracloneanti-d  |
| 42 | Seraclone mbl2 solution de liss                          |
| 43 | Seraclonehumanantiglobulin                               |
| 44 | Seraclone anti- cde                                      |
| 45 | Advanced hbselisa  |
| 46 | Advanced hcvelisa  |
| 47 | Glucose pap  |
| 48 | Uricacid   |
| 49 | Pathozymehbs   |
| 50 | Immutreprpr  |
| 51 | Advanced hiv 1&2 elisa                                   |
| 52 | Anti-hiv 1/2 cassette cromatest                          |
| 53 | Anti-hiv1+2 cromatest                                    |
| 54 | Anti-hcvcromatest  |
| 55 | Glucose mrcromatest                                      |
| 56 | Creatininecromatest                                      |
| 57 | Salmonella typhi et paratyphi (futura system)            |
| 58 | Double check hiv1&2                                      |
| 59 | Anti-a monoclonal institut de biotechnologie jacques boy |
| 60 | Anti-b monoclonal institut de biotechnologie jacques boy |
| 61 | Tphabsm  |
| 62 | Equi-hbs ag  |
| 63 | Hcv ab iv recombinant                                    |
| 64 | Syphilis eia   |
| 65 | Medibag poche simple cpda 250ml                          |
| 66 | Medibag poche simple cpda 450ml                          |
| 67 | Medibag poche double cpda-1 450ml                        |

113

|     |  |
|-----|--|
| 68  | Medibagpoche triple cpda-1 450ml                   |
| 69  | Rapid signal hcvserum/sang total cassette          |
| 70  | Rapid signal hcvsérum/sang total bandelette        |
| 71  | Equi-hiv1/2 recombinant                            |
| 72  | Immunocomb ii hiv1/2 trispotag-ab                  |
| 73  | Ict malaria p.f                                    |
| 74  | Malaria combo pf, pv, pm, po                       |
| 75  | Humatype anti- a                                   |
| 76  | Humatype anti- b                                   |
| 77  | Humatype anti- ab                                  |
| 78  | Humatype anti- d (igm)                             |
| 79  | Humatype anti- d (igm/igg)                         |
| 80  | Humatype anti- human globulin                      |
| 81  | Humatype albumin 22%                               |
| 82  | Combina 3  |
| 83  | Glucose liquicolor                                 |
| 84  | Instihiv antibody test                             |
| 85  | Transfuseur  |
| 86  | Immunoflow hiv1-hiv2 wb                            |
| 87  | Sd malaria ag p.f/pan                              |
| 88  | Sd malaria p.f                                     |
| 89  | Sd syphilis 3.0                                    |
| 90  | Sd hiv-1/2 3.0                                     |
| 91  | Hivtri-dot   |
| 92  | Hiv/1/2/o  |
| 93  | Determine hiv- 1/2 ag/ab combo                     |
| 94  | Clearview malaria p.f                              |
| 95  | Tube bd vacutainer sst ii advance                  |
| 96  | Tube bd vacutainer fluorure de na edtadipotassique |
| 97  | Tube bd vacutainer edta k2                         |
| 98  | Aiguille bd eclipse                                |
| 99  | Aiguille bd safety-lok                             |
| 100 | Ds-eia-anti-hiv-unif                               |
| 101 | Ds-eia-hbsag                                       |
| 102 | Genie iii hiv 1/hiv2                               |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 103 | Hiv tdrbiovegemed            |
| 104 | Hiv (1+2) (elisa) ab/ag      |
| 105 | Ultra hbsag                  |
| 106 | Malaria p.f                  |
| 107 | Syphilis tphaliquid          |
| 108 | Crp                          |
| 109 | Ureecolorimetricque          |
| 110 | Immunoquickmalariafalciparum |
| 111 | Cholesterol liquicolor       |
| 112 | Creatinineliquicolor         |
| 113 | Urealiquicolor               |
| 114 | Uricacidliquicolor           |
| 115 | Gpt (alat) ifccliquimoduv    |
| 116 | Got (asat) ifcc mod uv       |
| 117 | Bilirubind+tllicolor         |
| 118 | Hbs ag elisa                 |
| 119 | Human antiglobulin (agh)     |
| 120 | Liss                         |
| 121 | Retrocheck hiv               |
| 122 | Nanosignhiv ½                |
| 123 | Triglyceridesliquicolor      |
| 124 | Total protein liquicolor     |
| 125 | Calcium liquicolor           |
| 126 | Magnesiumliquicolor          |
| 127 | Acide phosphatase            |
| 128 | Ldlcholesterolliquicolor     |
| 129 | Hdl cholesterol liquicolr    |
| 130 | Glycohemoglobinhb a1         |
| 131 | Phosphorusliquirapid         |
| 132 | Iron liquicolor              |
| 133 | Acideurique                  |
| 134 | Alt/tgp (ifcc)               |
| 135 | Ast/tgo (ifcc)               |
| 136 | Creatinine                   |
| 137 | Glucose                      |

MB

|     |  |
|-----|--|
| 138 | Nanosignhbs ag   |
| 139 | Creatinine jaffe   |
| 140 | Imunoquick malaria + 4                                     |
| 141 | Architect hbs ag qualitatif                                |
| 142 | Architect anti-hcv qualitatif                              |
| 143 | Architect syphilis tp                                      |
| 144 | Architect hivag/ac combo+drt                               |
| 145 | Geniefast hiv 1/2  |
| 146 | pima cd4   |
| 147 | Onesitehbs ag combo rapid test                             |
| 148 | Abon hiv 1/2/o tri-line                                    |
| 149 | Certest salmonella typhi+paratyphi                         |
| 150 | Abbott real time hiv1 qualitative amplification reagen kit |
| 151 | Nanosign malaria pf ag,                                    |
| 152 | Nanosignhcg  |
| 153 | Anti-a monoclonal  |
| 154 | Anti-b monoclonal  |
| 155 | Anti-ab monoclonal   |
| 156 | Anti-d (igm) monoclonal                                    |
| 157 | Anti-d (igm+ igg) monoclonal                               |
| 158 | Vikia hiv1/2   |
| 159 | Monoclonal anti-a  |
| 160 | Monoclonal anti-b  |
| 161 | Monoclonal anti-ab   |
| 162 | Monoclonal anti-d(igm+igg)                                 |
| 163 | Advanced quality hbsags one step                           |
| 164 | One step anti tp (treponema pallidum)                      |
| 165 | Monoclonal anti- a   |
| 166 | Monoclonal anti-b  |
| 167 | Monoclonal anti-ab   |
| 168 | Monoclonal anti-d (igg+igm) blend                          |
| 169 | Antiglobuline  |
| 170 | Liss   |
| 171 | Abon syphilis  |
| 172 | Poches a sang simples                                      |

AB



|     |   |
|-----|---|
| 173 | Poches a sang doubles                   |
| 174 | Transfuseur                             |
| 175 | Cypress diagnostic tpha                 |
| 176 | Geenius hiv1/2 confirmation assay       |
| 177 | Erycloneanti-a                          |
| 178 | Erycloneanti-b                          |
| 179 | Eryclone anti-ab                        |
| 180 | Erybank h lectin                        |
| 181 | Erybank a1 lectin                       |
| 182 | Erycloneanti-digg                       |
| 183 | Erycloneanti-digm                       |
| 184 | Rhofina anti-d (igg+igm)                |
| 185 | Erybank anti-rh-hr control              |
| 186 | Erycloneanti-c+d+e                      |
| 187 | Erycloneanti-c                          |
| 188 | Erycloneanti-c                          |
| 189 | Erycloneanti-e                          |
| 190 | Erycloneanti-e                          |
| 191 | Erybank anti-humanigg                   |
| 192 | Erybank anti-bsa                        |
| 193 | Erybanktuliss                           |
| 194 | anti-a monoclonal                       |
| 195 | anti-b monoclonal                       |
| 196 | anti-ab monoclonal                      |
| 197 | Anti-d (igm+igg) monoclonal             |
| 198 | Humanantiglobulin                       |
| 199 | Liss                                    |
| 200 | Hcv one step rapid test healagen        |
| 201 | Glucose godpap                          |
| 202 | Demotek poche a sang simple cpda-1      |
| 203 | Demotek poche a sang double cpda-1      |
| 204 | Demotek poche a sang triple cpda-1      |
| 205 | Demotek pochés a sang quadruples cpda-1 |
| 206 | Demotek pochés a sang triples cpd+sagm  |
| 207 | Demotek poche a sang quadruple cpd+sagm |

MB

|     |   |
|-----|---|
| 208 | Transfuseur demotek                         |
| 209 | One step malaria p.f/p.v tri-line test card |
| 210 | Malaria hrp 2 /pan                          |
| 211 | Vikia malaria agpf/pan                      |
| 212 | Sdbioline malaria pf3 lignes                |
| 213 | Malaria (hrp2) 2014                         |
| 214 | Sdbiolinehiv/syphilis duo                   |
| 215 | Anti-hcvelisa 4.0 (kapga4nae3)              |
| 216 | Hbsagelisa (kapga4sge3)                     |
| 217 | Crp latex biobas                            |
| 218 | Glucose biobas                              |
| 219 | Anti-a monoclonal biobas                    |
| 220 | Anti-b monoclonal biobas                    |
| 221 | Anti-ab monoclonal biobas                   |
| 222 | Anti-d monoclonal biobas                    |
| 223 | Anti-a monoclonal                           |
| 224 | Anti-b monoclonal                           |
| 225 | Anti-ab monoclonal                          |
| 226 | Anti-d monoclonal                           |
| 227 | Liss solution                               |
| 228 | Acide urique                                |
| 229 | Alat/gpt                                    |
| 230 | Calcium arsenaso iii                        |
| 231 | Creatinine                                  |
| 232 | Cholesterol                                 |
| 233 | Asat/got                                    |
| 234 | Uree-uv                                     |
| 235 | Uree  |
| 236 | Triglycerides                               |
| 237 | Porche a sang simple                        |
| 238 | Porche a sang double                        |
| 239 | Porche a sang triple                        |
| 240 | Porche a sang quadruple                     |
| 241 | Transfuseur                                 |
| 242 | Crp-latex                                   |

NB

|   |  |
|---|--|
| 243   | Tpha. Agglutination sur plaque 100tests      |
| 244   | Creatinine-j.jaffe. Colorimetrique-cinetique |
| 245   | Magnesiumxylydylblue                         |
| 246   | Calcium-a iii                                |
| 247   | Biotracerhbsag/ test rapide                  |
| 248   | Biotracerhcv/ test rapide                    |
| 249   | Biotracer malaria p.f/pan /test rapide       |
| 250   | Biotracer syphilis /test rapide              |
| 251   | Prietest glucose                             |
| 252   | Prietest calcium                             |
| 253   | Prietestcreatinine jaffe                     |
| 254   | Transamilase (got&gpt)                       |
| 255   | Hvc cassette test                            |
| 256   | Magnesiummrcromatest                         |
| 257   | Calcium cromatest                            |
| 258   | Ureecromatest                                |
| 259   | Rh anti-d (igg+igm) monoclonal cromatest     |
| 260   | Anti-a monoclonal cromatest                  |
| 261   | Anti-b monoclonal cromatest                  |
| 262   | Anti- a+b monoclonal cromatest               |
| 263   | Hvcrapid test cassette                       |
| 264   | Hbsagrapid test cassette                     |
| 265   | Sdbioline malaria ag p.f                     |
| 266   | Sdbioline hiv-1/2 3.0                        |
| 267   | Sdbiolinehbsagwb                             |
| 268   | Sfri glucose                                 |
| <b>SUBSTANCES DE REFERENCES POUR CONTRÔLE QUALITE</b> |  |
| 269   | Albendazole                                  |
| 270   | Amikacin                                     |
| 271   | AmlodipineBesylate                           |
| 272   | Amoxicilline                                 |
| 273   | Artemether                                   |
| 274   | Artemetherrelated compound A                 |
| 275   | Artemetherrelated compound B                 |

213

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 276 | Artesunate              |
| 277 | Ascorbic Acid           |
| 278 | Aspirine                |
| 279 | Atorvastatin Calcium    |
| 280 | Azithromycine           |
| 281 | Baclofen                |
| 282 | Cafeine                 |
| 283 | Captopril               |
| 284 | CefepimeHydrochloride   |
| 285 | Cefixime                |
| 286 | CefpodoximeProxetil     |
| 287 | Ceftriaxone Sodium      |
| 288 | CefuroximeAxetil        |
| 289 | Cefuroxime Sodium       |
| 290 | Celecoxib               |
| 291 | CetirizineHydrochloride |
| 292 | Chlorhexidine acétate   |
| 293 | Ciprofloxacin           |
| 294 | Clarithromycine         |
| 295 | Desloratadine           |
| 296 | Dexamethasone           |
| 297 | Diazepam                |
| 298 | Diclofenac potassium    |
| 299 | Diclofenac Sodium       |
| 300 | Doxycyclinemonohydraté  |
| 301 | Efavirenz               |
| 302 | Emtricitabine           |
| 303 | EnalaprilMaleate        |
| 304 | Erythromycine           |
| 305 | Esomeprazole strontium  |
| 306 | Fluconazole             |
| 307 | Fluticasonepropionate   |
| 308 | Folic Acid              |
| 309 | Furosémide              |
| 310 | Glimepiride             |

AB

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 311 | Glipizide                  |
| 312 | Hydrochlorothiazide        |
| 313 | Ibuprofène                 |
| 314 | Imipenem Monohydrate       |
| 315 | Iopamidol                  |
| 316 | Ketoprofen                 |
| 317 | Lamivudine                 |
| 318 | Lansoprazole               |
| 319 | Levetiracetam              |
| 320 | Levofloxacin               |
| 321 | Levonorgestrel             |
| 322 | LoperamideHydrochloride    |
| 323 | Loratadine                 |
| 324 | Losartan Potassium         |
| 325 | Mebendazole                |
| 326 | Meloxicam                  |
| 327 | Metformine Hydrochloride   |
| 328 | Methocarbamol              |
| 329 | MetoclopramideHcl          |
| 330 | Metronidazole              |
| 331 | Miconazole Nitrate         |
| 332 | Mifepristone               |
| 333 | Misoprostol                |
| 334 | Montelukast Sodium         |
| 335 | Neomycin Sulfate           |
| 336 | Névirapine anhydre         |
| 337 | Nifedipine                 |
| 338 | Norfloxacin                |
| 339 | Omeprazole                 |
| 340 | OmeprazoleMagnesium        |
| 341 | Pantoprazole sodium        |
| 342 | PerindoprilErbumine        |
| 343 | Phénobarbital              |
| 344 | PhenylephrineHydrochloride |
| 345 | Pyrimethamine              |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 346 | Quinine Hydrochloride Dihydrate |
| 347 | Quinine Sulfate                 |
| 348 | Ramipril                        |
| 349 | Sildenafil Citrate              |
| 350 | Simvastatine                    |
| 351 | Streptomycin Sulfate            |
| 352 | Sulfadoxine                     |
| 353 | Sulfamethoxazole                |
| 354 | Tadalafil                       |
| 355 | Telmisartan                     |
| 356 | Tenofovir                       |
| 357 | Trimethoprim                    |
| 358 | Zidovudine                      |

*JAB*